

## 護理站消耗性藥品之保存期限

品 名	貯存條件及開封後保存期限
Alcohol 75% (4000ml)	開封後保持乾燥，遠離火源，日照，潮濕，因所含成分易揮發開封後儘早用畢，減少開瓶次數及時間可放至效期。
Alcohol 95%	因所含成分易揮發保持乾燥，遠離火源，日照，潮濕，儘早用畢，減少開瓶次數及時間可放至效期。
Alcohol 75% gel(500 ml)	開封後保持乾燥，遠離火源，日照，潮濕，因所含成分易揮發開封後儘早用畢，減少開瓶次數；至多可用 6 個月(感控因素考量)。
H2O2(雙氧水)	開封後保持乾燥，遠離火源，日照，潮濕，因所含成分易揮發開封後儘早用畢，減少開瓶次數及時間可放至效期。
Antigerm (Hi-bi scrub 5000ml)	開封後儘早用完，在室溫、避光、乾燥環境中貯存，可放 3-6 個月。
Chlorhexidine 2% 200ml (Easy Antiseptic Liq._Alc2% 200ml)	含酒精，開封後儘早用完，因所含成分易揮發保持乾燥，遠離火源，日照，潮濕，減少開瓶次數及時間可放 1 個月。
Betadin Tr. 500mL	含酒精，開封後保持乾燥，遠離火源，日照，潮濕，因所含成分易揮發開封後儘早用畢，至多可用 1 個月(感控因素考量)。
Polvidine Solution(100ml) Polvidine Solution(250ml)	開封後儘早用畢，瓶口無污染的情況下室溫可放 1 個月。
Normal Saline 沖洗用	開封後保持陰涼乾燥一天內用完。
Lidocaine Jelly	開封後緊閉瓶蓋，減少開瓶次數及時間可放至效期(建議開封超過 6 個月丟棄)。
Xylocaine® Spray 10%	貯存於 25°C 以下，儲存於 8°C 以下時可能會發生沉澱，此沉澱可在室溫下回溫時溶解。建議開封超過 6 個月丟棄。
Silvazine 200gm/Bot	開封後緊閉瓶蓋，減少開瓶次數及時間可放至效期(建議開封超過 6 個月丟棄)。

藥學部 2017 年 3 月更新