

臺中榮總不宜磨粉藥品清單

2024/06 更新

藥碼	螢幕名	學名	中文商品名	磨粉建議
PAX03	(\$) Paxlovid tab	PF-07321332, Ritonavir 150+100mg	倍拉維150毫克/100毫克膜衣錠	需整顆吞服，不得咀嚼、分開或壓碎。若確實需管灌給藥的話，可參考廠商提供的「 Paxlovid經管灌給藥資料_1111007-2022/10 、 Paxlovid 經管灌給藥用藥指導單張2022/10 」方式處理，但廠商聲明「 Paxlovid 錠劑未被核准經由管灌給藥 」。輝瑞不建議以這種方式使用
BC670	(CDC) Lamprene cap 100mg	Clofazimine cap 100mg		Clofazimine cap (Lamprene cap)必須整顆吞服，不可打開膠囊。
LAG01	(CDC) Molnupiravir cap 200mg	Molnupiravir cap 200mg		抗病毒藥物，需整粒吞服，切勿打開、破壞或壓碎膠囊111/04/22新增：無法口服且有用藥需求之病患，可以考慮打開膠囊以口服懸浮液配置(oral suspension)方式給予病患，但須注意此做法之效用並未在臨床試驗中評估。
TPO01	(CDC) Tpoxx cap 200mg	Tecovirimat cap 200mg		若無法吞嚥膠囊，可將單次劑量膠囊小心地打開，將所有內容物與 30mL液體（例如：牛奶、巧克力牛奶）或軟質食物（例如：蘋果醬、優格）混合，並應於混合後 30分鐘內服用完所有混合物。
LEV06	(CDCTB) Levonolon tab	Levofloxacin tab 500mg	樂富妥膜衣錠500毫克	不宜研磨，可剝半。
PRE06	(CDCTB) Pretomanid tab	Pretomanid tab 200mg		需整粒吞服。
SIR01	(CDCTB) Sirturo tab 100mg	Bedaquiline fumarate tab 100mg	斯耐瑞錠100毫克	錠劑可用水溶開服用，或用水溶開後進一步和飲料或軟質食物混合服用，或研碎後和軟質食物混合服用，或透過餵食管給藥。
BT530	(CDCTB) Terizidon cap 250mg	Terizidon cap 250mg		整粒伴隨足夠的水吞服。
AL310	(CDCTB) VorotaL tab 500mg	Levofloxacin tab 500mg	樂富妥膜衣錠500毫克	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半。
OPS02	(CM) Opsumit f.c. tab 10 mg	Macitentan f.c. tab 10mg	奧欣明膜衣錠10毫克	膜衣錠應以開水整錠吞服；不可以剝半、弄碎或嚼碎。
TAG02	(EAP) Tagrisso tab 80mg-30's/box	Osimertinib tab 80mg	泰格莎膜衣錠80毫克*30顆/盒	1.屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套、穿防護衣）。2.錠劑必須整顆吞服，不可以敲碎或磨粉。3.遇吞嚥困難病人，可將錠劑加入50mL白開水，攪拌均勻使崩散後立刻喝下或從N-G管灌；再以120至240mL白開水潤洗杯子後，立即喝下或從N-G管灌。
AB930	(Free) 30mg Giotrif tab	Afatinib dimaleate tab 30mg	妥復克膜衣錠30毫克	藥粒需整顆吞服，無法吞服藥粒的病人，可將藥錠放入100毫升飲用水中攪拌溶解後立即使用，再以100毫升飲用水潤洗殘留在杯中藥物並服下。以此方式可經由鼻胃管給藥。
JAK01	(Free) Jakavi tab 5mg	Ruxolitinib tab 5mg	捷可衛錠5毫克	Jakavi 必須整顆吞服，不可切開、敲碎或咀嚼。從NG tube 管灌時，一顆加入40 mL水中，攪拌10分鐘後給藥，再以75 mL水沖洗 NG tube；Jakavi崩散於水後應在6小時內服用完畢。
LOR04	(Free) Lorviqua tab 25mg	Lorlatinib f.c. tab 25mg		必須以至少240mL的水完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎或剝半。
NER02	(Free) Nerlynx tab 40mg	Neratinib tab 40mg	賀儼安膜衣錠40毫克	需整粒吞服，不可以剝半、咬碎、咀嚼。
NUB01	(Free) Nubeqa tab 300mg	Darolutamide f.c. tab 300mg	諾博戈膜衣錠300毫克	建議與食物併服並吞服整顆藥，不可剝半、咬碎或研磨。
CAP08	(Free) Tabrecta tab 200mg	Capmatinib f.c. tab 200mg	泰芮塔200毫克膜衣錠	需整顆吞服，請勿剝半、研磨或咀嚼。
TAF03	(Free) Tafinlar cap 75mg	Dabrafenib cap 75mg	泰伏樂膠囊75毫克	屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套）。膠囊應以水整粒吞服，勿嚼碎、弄破、或打開。
VER02	(Free) Verzenio tab 150mg	Abemaciclib f.c. tab 150mg	捷嘉寧膜衣錠150毫克	應整顆吞服，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服。
TAG01	(Free) Tagrisso tab 80mg-10's/box	Osimertinib tab 80mg	泰格莎膜衣錠80毫克*10顆/盒	1.屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套、穿防護衣）。2.錠劑必須整顆吞服，不可以敲碎或磨粉。3.遇吞嚥困難病人，可將錠劑加入50mL白開水，攪拌均勻使崩散後立刻喝下或從N-G管灌；再以120至240mL白開水潤洗杯子後，立即喝下或從N-G管灌。
RIT01	(LA) 20mg Ritalin cap	Methylphenidate HCL LA cap	利長能持續性藥效膠囊	
TAM03	(LOTUS) 100mg Tamos cap	Temozolomide cap 100mg	特莫斯膠囊100毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
TAM02	(LOTUS) 20mg Tamos cap	Temozolomide cap 20mg	特莫斯膠囊20毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
NI010	(TPOG) Roaccutane soft cap 20mg	Isotretinoin soft cap 20mg	羅可坦軟膠囊20毫克	具黏膜刺激性及致畸胎性，不宜磨粉或咀嚼。
XEL02	(XR) 11mg Xeljanz tab	Tofacitinib XR tab 11mg	捷抑炎持續性藥效錠11毫克	需整粒吞服不可壓碎、剝半或咀嚼。
AR310	(□) 1.5mg Exelon cap	Rivastigmine cap 1.5mg	憶思能膠囊1.5毫克	需整顆吞服。若無法整粒吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
DEP04	(□) 200mg Depakine tab	Valproate sodium tab 200mg	帝拔癲腸溶錠	藥品易吸潮，且對粘膜有刺激性；腸溶錠宜整粒吞服，不可剝半服用。
AV500	(□) 20mg Navelbine soft cap	Vinorelbine soft cap 20mg	溫諾平20毫克軟膠囊	溫諾平軟膠囊為口服抗癌藥；必須在用餐時以水整顆吞服(不可嚼食或剝開膠囊)。
BS040	(□) 25mg Sandimmun Neoral cap	Ciclosporin cap 25mg	新體睦軟膠囊25毫克	內含油狀物，應整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼。使用鼻胃管病人請改用口服液劑型。
FM040	(□) 30mg Morphine S.R. tab	Morphine sulfate tab 30mg	嗎啡長效膜衣錠30毫克	磨粉後破壞控制釋放的設計。
AV510	(□) 30mg Navelbine soft cap	Vinorelbine soft cap 30mg	溫諾平30毫克軟膠囊	溫諾平為口服抗癌藥；必須在用餐時以水整顆吞服(不可嚼食或剝開膠囊)。
AR370	(□) 3mg Exelon cap	Rivastigmine cap 3mg	憶思能膠囊3毫克	需整顆吞服。若無法整粒吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
BP290	(□) 3mg Invega ER tab	Paliperidone ER tab 3mg	思維佳持續性藥效錠3毫克	需整粒吞服；不可咬碎、分割或磨碎藥錠。是一種OROS 滲透壓控制釋出的口服劑型。
AR380	(□) 4.5mg Exelon cap	Rivastigmine cap 4.5mg	憶思能膠囊4.5毫克	需整顆吞服。若無法整粒吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
AD030	(□) 500mg Chrono Depakine tab	Valproate sodium tab 500mg	帝拔癲持續性藥效膜衣錠500毫克	磨粉後破壞控制釋放的設計，造成血中濃度不穩定；可剝半服用。
EXE01	(□) 6mg Exelon cap	Rivastigmine cap 6mg	憶思能膠囊6毫克	需整顆吞服。若無法整粒吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
INV01	(□) 9mg Invega ER tab	Paliperidone ER tab 9mg	思維佳持續性藥效錠9毫克	需整粒吞服；不可咬碎、分割或磨碎藥錠。是一種OROS 滲透壓控制釋出的口服劑型。
AM880	(□) Avelox f.c. tab 400mg	Moxifloxacin f.c. tab 400mg	威洛速膜衣錠400毫克	有特殊的味道，建議整粒吞服。
CRE02	(□) Cresemba cap 100mg	Isavuconazole cap 100mg	驅黴霸100毫克膠囊	須整顆膠囊吞服。勿嚼碎、擠壓、溶解或打開膠囊。可伴隨食物或空腹服用。
END01	(□) Endoxan tab 50mg	Cyclophosphamide tab 50mg	癌德星錠	有致畸胎可能性，癌德星錠應整粒吞服。勿嚼碎、弄破或搗碎。
FYC01	(□) Fycompa f.c. tab 2mg	Perampanel f.c. tab 2mg	癲控達膜衣錠2毫克	應整錠吞服，不可咀嚼、壓碎或剝半服用。
AL140	(□) Keppra tab 500mg	Levetiracetam tab 500mg	優閒膜衣錠500毫克	有特殊苦味，不宜磨粉。
AC910	(□) Klaricid tab 500mg	Clarithromycin tab 500mg	開羅理黴素膜衣錠500毫克	有特殊味道，建議整粒吞服。
AN280	(□) Nimotop f.c. tab 30mg	Nimodipine f.c. tab 30mg	腦妥膜衣錠30毫克	有特殊味道，需整粒吞服，不宜磨粉。
AP110	(□) Pantoloc tab 40mg	Pantoprazole tab 40mg	保衛康治潰樂腸溶膜衣錠40毫克	磨粉後破壞腸胃，故建議整粒吞服。宜餐前一小時空腹服用。
POS01	(□) PosanoL tab 100mg	Posaconazole tab 100mg	波賽特錠劑100毫克	須整粒吞服，勿剝半、壓碎或咀嚼。
REN02	(□) Renvela tab 800mg	Sevelamer carbonate tab 800mg	磷減樂錠	Renvela 錠劑應整顆吞服，不可磨碎、咀嚼或剝開藥品。
TAI01	(□) Taigexyn cap 250mg	Nemonoxacin cap 250mg	太捷信膠囊250毫克	以水整粒吞服。(仿單)
AL680	(□) Takepron OD tab 30mg	Lansoprazole OD tab 30mg	泰克胃通口溶錠30毫克	將本藥置於舌頭上，可立即溶解，勿咀嚼，直接吞服，或配適量溫開水吞服。可剝半但不可磨粉。經由鼻胃管 給藥時，將藥錠放入針筒中，抽取約10 ml 的水；輕搖 以使快速崩解；藥錠崩散後，請於15 分鐘內經由鼻胃 管給藥；針筒重新抽取約5 ml 的水，輕搖後用以沖洗 鼻胃管。
BS030	(□) 100mg Sandimmun NemoraL cap	Ciclosporin cap 100mg	新體睦軟膠囊100毫克	內含油狀物，應整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼。使用鼻胃管病人請改用口服液劑型。
CUR03	(□溶) Curam OD tab 1000mg	Amoxicillin 875mg,Clav 125mg tab	諾快寧口溶錠1000毫克	口溶錠可先與半杯水（至少30mL）攪拌後再吞服；或是放入口中，待口溶錠崩散後再吞服。
MIN03	(□溶) Minirin melt tab 60mcg	Desmopressin melt tab 60mcg	迷你寧凍晶口溶錠60mcg	不建議磨粉，因 Minirin Melt tab 60 mcg 為凍晶舌下口溶錠，置於舌下即可吸收。

藥碼	螢幕名	學名	中文商品名	磨粉建議
COT01	(國衛) Cotellic tab 20mg	Combimetinib f.c. tab 20mg	可泰利膜衣錠20毫克	須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。
TEP03	(國衛) Tepmetko tab 225mg	Tepotinib tab 225mg	德邁特膜衣錠225毫克	應整粒吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
ZEL03	(國衛) Zelboraf tab 240mg	Vemurafenib tab 240mg	日沛樂膜衣錠240毫克	應搭配1 杯開水整顆吞服，不應咀嚼或咬碎。
ALP03	(專案) 200mg Alpelisib tab	Alpelisib tab 200mg		需整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
ONU01	(專案) 200mg Onureg tab	Azacitidine tab 200mg		不建議磨粉、剝半、咀嚼。
ONU02	(專案) 300mg Onureg tab	Azacitidine tab 300mg		不建議磨粉、剝半、咀嚼。
SEL03	(專案) 80mg Selpercatinib cap	Selpercatinib(LY3527723) cap80mg		化學治療藥，需整粒吞服。
MET25	(專案) Metalcaptase tab	D-Penicillamine tab 300mg		不宜磨粉。
SEL04	(專案) Selumetinib cap 10mg	Selumetinib cap 10mg		需整粒吞服，不可咀嚼、溶解或打開膠囊。
TEP01	(專案) Tepmetko tab 225mg	Tepotinib tab 225mg		應整粒吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
ALM01	(專案)Almonertinib tab 55mg	Almonertinib tab 55mg	阿美樂	1. 如果患者無法整顆吞服藥品，可將藥錠直接溶於50 mL不含碳酸鹽的飲用水中，攪拌至完全溶解後服用。隨後加入半杯飲用水，確認杯內無殘留後，隨即迅速飲用。2. 需要經鼻胃管餵食時，應先用15 mL不含碳酸鹽的飲用水將藥錠溶解，再用15 mL飲用水沖洗殘留藥品。總共30 mL液體，按照鼻胃管生產商說明書進行餵食，再用適量的飲用水沖洗鼻胃管。整個餵食過程應在藥錠投入飲用水中30分鐘內完成。
TAK02	(專案)TAK-788(Mobocertinib) 40mg	Mobocertinib cap 40mg		為化療藥品，不可以壓碎或磨粉，拿取時應做好防護措施(例如帶手套)。
BM460	(顆粒) Pentasa PR granules 2Gm	Mesalazine PR granules 2Gm	頗得斯安持續性藥效顆粒劑 2g	直接將顆粒劑倒在舌頭上，用水或果汁吞服，不可咀嚼。
AE660	0.25mg Certican tab	Everolimus tab 0.25mg	卓定康錠0.25毫克	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有30mL水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以30mL水潤洗容器後服下。
MIRO2	0.375mg Mirapex PR tab	Pramipexole PR tab 0.375mg	樂伯克持續性藥效錠 0.375毫克	樂伯克持續性藥效錠必須整顆吞服，不可嚼碎、壓碎或切割。
ADV10	0.5mg Advagraf cap	Tacrolimus PR hard cap 0.5mg	安瑞福0.5毫克持續性藥效膠囊	持續性藥效膠囊，需整粒吞服。
AE670	0.5mg Certican tab	Everolimus tab 0.5mg	卓定康錠0.5毫克	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有30mL水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以30mL水潤洗容器後服下。
RAP01	0.5mg Rapamune tab	Sirolimus tab 0.5mg	斥消靈錠0.5毫克	Sirolimus是一種利用NanoCrystal technology做成的特殊劑型，必須整粒吞服，不可以嚼碎、弄破或搗碎。
MIR10	1.5mg Mirapex PR tab	Pramipexole PR tab 1.5mg	樂伯克持續錠1.5毫克	樂伯克持續性藥效錠必須整顆吞服，不可嚼碎、壓碎或切割。
IBR02	100mg Ibrance cap	Palbociclib cap 100mg	愛乳適膠囊100毫克	Palbociclib膠囊應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎或打開膠囊。如果膠囊破損、有裂痕或殘缺不完整，請不要服用。
AE530	100mg Tarceva tab	Erlotinib tab 100mg	得舒緩膜衣錠100毫克	為口服抗癌藥；可將藥錠放入100 ml 的飲用水中，攪拌直到藥錠溶解後立即喝下；或經由鼻胃管管灌。
AT220	100mg Temodal cap	Temozolomide cap 100mg	帝盟多膠囊100毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
AT950	100mg Topamax tab	Topiramate tab 100mg	妥泰膜衣錠100毫克	1. Topiramate有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。
TRO08	100mg Trokendi XR cap	Topiramate XR cap 100MG	妥偏停持續性釋放膠囊 100毫克	1. 本院Topiramate有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. 本院Topiramate分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物 /食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。3.此藥為持續性釋放膠囊，不可以拆開需整粒服用。
VEN05	100mg Venclexta f.c. tab	Venetoclax f.c. tab 100mg	唯可來膜衣錠100毫克	應整顆吞服，不可咀嚼、咬碎或剝開。
LEN05	10mg Lenvima cap	Lenvatinib cap 10mg	樂衛瑪膠囊10毫克	Lenvima®膠囊可整粒吞服，或將膠囊先溶解於小杯液體後服用。將膠囊放入一大湯匙的水或蘋果汁中(膠囊不需打開或壓碎)，以溶解於液體。將膠囊靜置於水或蘋果汁中至少10 分鐘，再攪拌至少3 分鐘。飲用混合液後，再加入一大湯匙的水或蘋果汁於玻璃杯中，攪勻後再飲用完水或蘋果汁。
OXY02	10mg OxyContin CR tab	Oxycodone CR tab 10mg	疼始康定10毫克持續藥效錠	持續藥效錠，應整粒吞服，並配以足量的開水，不可切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解。
REV01	10mg Revlimid cap	Lenalidomide cap 10mg	瑞復美膠囊10毫克	有致畸胎性，必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊。
PRA10	110mg Pradaxa cap	Dabagatran etexilate cap 110mg	普栓達膠囊110毫克	膠囊必需整顆吞服，不可咀嚼、撥開或壓碎；因可能導致藥物暴露量增加，使得出血風險增加。
IBR01	125mg Ibrance cap	Palbociclib cap 125mg	愛乳適膠囊125毫克	Palbociclib膠囊應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎或打開膠囊。如果膠囊破損、有裂痕或殘缺不完整，請不要服用。
BB140	125mg Tracleer tab-1st	Bosentan f.c. tab 125mg-1st	全可利膜衣錠125毫克	需整粒吞服。若無法吞服，於給藥前立即將其分散在最少量的水中立即服用。有可能致畸胎，懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的Bosentan錠劑。
TRA05	125mg Tracleer tab-2nd	Bosentan f.c. tab 125mg-2nd	愛可泰隆全可利膜衣錠 125毫克	需整粒吞服。若無法吞服，於給藥前立即將其分散在最少量的水中立即服用。有可能致畸胎，懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的Bosentan錠劑。
RYB04	14mg Rybelsus tab	Semaglutide tab 14mg	瑞倍適錠14毫克	整顆吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
PRA20	150mg Pradaxa cap	Dabagatran etexilate cap 150mg	普栓達膠囊150毫克	膠囊必需整顆吞服，不可咀嚼、撥開或壓碎；因可能導致藥物暴露量增加，使得出血風險增加。
AE540	150mg Tarceva tab	Erlotinib tab 150mg	得舒緩膜衣錠150毫克	為口服抗癌藥；可將藥錠放入100 ml 的飲用水中，攪拌直到藥錠溶解後立即喝下；或經由鼻胃管管灌。
AN740	150mg Tasigna cap	Nilotinib cap 150mg	泰息安膠囊150毫克	整粒吞服，勿將膠囊打開或咬碎。破壞膠囊可能會使血中濃度增加、增加毒性。(ISMP)
JAK03	15mg Jakavi tab	Ruxolitinib tab 15mg	捷可衛錠15毫克	1.Jakavi 必須整顆吞服，不可切開、敲碎或咀嚼。2.從NG tube 管灌時，一顆加入40 mL水中，攪拌10分鐘後給藥，再以75 mL水沖洗NG tube； Jakavi崩散於水後應在6小時內服用完畢。
LIX03	15mg Lixiana f.c. tab	Edoxaban f.c. tab 15mg	里先安膜衣錠15毫克	無法吞服整顆錠劑之病人，可將錠劑壓碎混合於水中或蘋果泥中，立即口服使用；或壓碎後懸浮於少量水中，立即經由由胃管給藥，之後並應以水沖洗。壓碎錠劑在水和蘋果泥中穩定長達4小時。
LON03	15mg Lonsurf tab	Trifluridine, Tipiracil tab 15mg	朗斯弗膜衣錠15毫克	膜衣錠應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎。管灌：投入適量的溫水中 (22~55℃)，約15分鐘後，即可調配成懸浮溶液。藥品配置後，可放在室溫穩定6小時。
ALU06	180mg Alunbrig f.c. tab	Brigatinib f.c. tab 180mg	癌能畢膜衣錠180毫克	Brigatinib可伴隨食物或空腹服用。應整粒吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
BM020	18mg Concerta ER tab	Methylphenidate ER tab 18mg	專思達長效錠18毫克	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
BT460	1mg Advagraf cap	Tacrolimus PR hard cap 1mg	安瑞福1毫克持續性藥效膠囊	持續性藥效膠囊，需整粒吞服。
INL10	1mg Inlyta f.c. tab	Axitinib f.c. tab 1mg	抑癌特膜衣錠1毫克	為口服抗癌藥，不可磨粉、不可剝半使用。應以一杯水整顆吞服。
AS460	1mg Rapamune tab	Sirolimus tab 1mg	斥消靈錠1毫克	1.Sirolimus是一種利用NanoCrystal technology做成的特殊劑型，必須整粒吞服，不可以嚼碎、弄破或搗碎。
ADE08	2.5mg Adempas f.c. tab	Riociguat f.c. tab 2.5mg	愛定保肺膜衣錠2.5毫克	不可剝開、研碎或嚼碎。
UPT04	200mcg Upravi f.c. tab	Selexipag f.c. tab 200mcg	尚達利膜衣錠200微克	需整粒吞服，不可將藥錠剝半、壓碎或咀嚼，並應以白開水吞服。
AN680	200mg Tasigna cap	Nilotinib cap 200mg	泰息安膠囊200毫克	整粒吞服，勿將膠囊打開或咬碎。破壞膠囊可能會使血中濃度增加、增加毒性。(ISMP)
CAB06	20mg Cabometyx f.c. tab	Cabozantinib f.c. tab 20mg	癌必定膜衣錠20毫克	必須整粒錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。癌必定膜衣錠屬Hazardous agent，拿取時請戴單層手套。
LON04	20mg Lonsurf tab	Trifluridine, Tipiracil tab 20mg	朗斯弗膜衣錠20毫克	膜衣錠應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎。管灌：投入適量的溫水中 (22~55℃)，約15分鐘後，即可調配成懸浮溶液。藥品配置後，可放在室溫穩定6小時。

藥碼	螢幕名	學名	中文商品名	磨粉建議
OXY03	20mg OxyContin CR tab	Oxycodone CR tab 20mg	疼始康定20毫克持續藥效錠	持續藥效錠，應整粒吞服，並配以足量的開水，不可切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解。
AT070	20mg TemodaL cap	Temozolomide cap 20mg	帝盟多膠囊20毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
TS110	20mg TS-1 cap	Tegafur,GimeraciL,OteraciL 20mg	愛斯萬膠囊20毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
MET21	22mg Methydur SR cap	Methylphenidate SR cap 22mg	思有得持續性藥效膠囊22毫克	必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊。
BC730	250mg Xalkori cap	Crizotinib cap 250mg	截剋瘤膠囊250毫克	膠囊需整粒吞服，不可磨粉、溶解或打開膠囊。
MIX03	25mg Mixre cap	Atomoxetine cap 25mg	思敏膠囊25毫克	藥品具有刺激性，建議整粒吞服。
REV10	25mg Revlimid cap	Lenalidomide cap 25mg	瑞復美膠囊25毫克	有致畸胎性，必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊。
BT210	25mg Topamax cap	Topiramate sprinkle cap 25mg	妥泰分散型膠囊25毫克	1. Topiramate有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物 /食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。
TS120	25mg TS-1 cap	Tegafur,GimeraciL,OteraciL 25mg	愛斯萬膠囊25毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
CON02	27mg Concerta ER tab	Methylphenidate ER tab 27mg	專思達長效錠27毫克	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
DES03	2mg/0.5 Desud Plus sublingual	Buprenorphine 2mg,Naloxone 0.5mg	解佳益2/0.5毫克舌下錠	舌下錠需置於舌下直到溶化，不可咀嚼或直接吞服，否則會影響其藥效。
ALU05	30mg Alunbrig f.c. tab	Brigatinib f.c. tab 30mg	癌能畢膜衣錠30毫克	Brigatinib可伴隨食物或空腹服用。應整粒吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
GIO01	30mg Giotrif f.c. tab	Afatinib dimaleate tab 30mg	妥復克膜衣錠30毫克	需整粒空腹服用;若無法吞服整粒錠劑，可將藥錠放入約100 mL 飲用水(非碳酸類)中崩散，不可使用其他液體。將錠劑放入水中，不要壓碎，攪拌直到錠劑崩散成極小的顆粒(約15分鐘)後，立即喝下此溶液，再以約100 mL水潤洗殘留在杯中藥物並喝下。此溶液也可用鼻胃管餵食。
LIX02	30mg Lixiana f.c. tab	Edoxaban f.c. tab 30mg	里先安膜衣錠30毫克	無法吞服整顆錠劑之病人，可將錠劑壓碎混合於水中或蘋果泥中，立即口服使用；或壓碎後懸浮於少量水中，立即經由由胃管給藥，之後並應以水沖洗。壓碎錠劑在水和蘋果泥中穩定長達4小時。
VIZ02	30mg Vizimpro f.c. tab	Dacomitinib f.c. tab 30mg	肺欣妥膜衣錠30毫克	需整粒吞服，不可以剝半、咬碎、咀嚼。
MET19	33mg Methydur SR cap	Methylphenidate SR cap 33mg	思有得持續性藥效膠囊33毫克	必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊。
BM030	36mg Concerta ER tab	Methylphenidate ER tab 36mg	專思達長效錠36毫克	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
BAL01	3mg Balversa f.c. tab	Erdafitinib f.c. tab 3mg	盼樂膜衣錠3毫克	1. 需整粒吞服，不可剝半、咬碎或咀嚼，可隨食物或不隨食物服用。 2. 如果服藥後發生嘔吐，當天請不要再服藥，隔天再依正常的劑量服藥即可。 3. 忘記服藥時，請儘快服用漏服的藥物，並於隔天服用正常劑量即可。請勿服用2倍劑量。
RYB02	3mg Rybelsus tab	Semaglutide tab 3mg	瑞倍適錠3毫克	整顆吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
CAB05	40mg Cabometyx f.c. tab	Cabozantinib f.c. tab 40mg	癌必定膜衣錠40毫克	必須整粒錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。癌必定膜衣錠屬Hazardous agent，拿取時請戴單層手套。
GIO02	40mg Giotrif f.c. tab	Afatinib dimaleate tab 40mg	妥復克膜衣錠40毫克	藥粒需整顆吞服，若無法吞服整粒錠劑，可將藥錠放入約100 mL 飲用水(非碳酸類)中崩散，不可使用其他液體。將錠劑放入水中，不要壓碎，攪拌直到錠劑崩散成極小的顆粒(約15分鐘)後，立即喝下此溶液，再以約100 mL水潤洗殘留在杯中藥物並喝下。此溶液也可用鼻胃管餵食。
MIX04	40mg Mixre cap	Atomoxetine cap 40mg	思敏膠囊40毫克	藥品具有刺激性，建議整粒吞服。
RET01	40mg Retsevmo hard cap	Selpercatinib cap 40mg	銳癌寧膠囊40毫克	化學治療藥，需整粒吞服。
MET20	44mg Methydur SR cap	Methylphenidate SR cap 44mg	思有得持續性藥效膠囊44毫克	必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊。
VIZ01	45mg Vizimpro f.c. tab	Dacomitinib f.c. tab 45mg	肺欣妥膜衣錠45毫克	需整粒吞服，不可以剝半、咬碎、咀嚼。
BAL02	4mg Balversa f.c. tab	Erdafitinib f.c. tab 4mg	盼樂膜衣錠4毫克	1. 需整粒吞服，不可剝半、咬碎或咀嚼，可隨食物或不隨食物服用。 2. 如果服藥後發生嘔吐，當天請不要再服藥，隔天再依正常的劑量服藥即可。 3. 忘記服藥時，請儘快服用漏服的藥物，並於隔天服用正常劑量即可。請勿服用2倍劑量。
LEN02	4mg Lenvima cap	Lenvatinib cap 4mg	樂衛瑪膠囊4毫克	膠囊可整粒吞服，或將膠囊先溶解於小杯液體後服用。將膠囊放入一大湯匙的水或蘋果汁中(膠囊不需打開或壓碎)，以溶解於液體。將膠囊靜置於水或蘋果汁中至少10分鐘，再攪拌至少3分鐘。飲用混合液後，再加入一大湯匙的水或蘋果汁於玻璃杯中，攪勻後再飲用完水或蘋果汁。
POM02	4mg Pomalyst cap	Pomalidomide cap 4mg	鉑美特膠囊4毫克	Pomalyst膠囊必須整粒吞服，請勿壓碎、咀嚼或打開膠囊。
AR610	4mg Requip PD tab	Ropinirole prolonged release 4mg	力必平持續性藥效膜衣錠4毫克	為持續性藥效膜衣錠，必須整顆吞服；切勿咀嚼、壓碎或剝半使用。
TRO05	50mg Trokendi XR cap	Topiramate XR cap 50mg	妥偏停持續性釋放膠囊50毫克	1. 本院Topiramate有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. 本院Topiramate分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物 /食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。 3. 此藥為持續性釋放膠囊，不可以拆開需整粒服用。
BT470	5mg Advagraf cap	Tacrolimus PR hard cap 5mg	安瑞福5毫克持續性藥效膠囊	持續性藥效膠囊，需整粒吞服。
BAL03	5mg Balversa f.c. tab	Erdafitinib f.c. tab 5mg	盼樂膜衣錠5毫克	1. 需整粒吞服，不可剝半、咬碎或咀嚼，可隨食物或不隨食物服用。 2. 如果服藥後發生嘔吐，當天請不要再服藥，隔天再依正常的劑量服藥即可。 3. 忘記服藥時，請儘快服用漏服的藥物，並於隔天服用正常劑量即可。請勿服用2倍劑量。
INL01	5mg Inlyta f.c. tab	Axitinib f.c. tab 5mg	抑癌特膜衣錠5毫克	為口服抗癌藥，不可磨粉、不可剝半使用。應以一杯水整顆吞服。
JAK02	5mg Jakavi tab	Ruxolitinib tab 5mg	捷可衛錠5毫克	Jakavi 必須整顆吞服，不可切開、敲碎或咀嚼。從NG tube 管灌時，一顆加入40 mL水中，攪拌10分鐘後給藥，再以75 mL水沖洗NG tube；Jakavi崩散於水後應在6小時內服用完畢。
UPT05	600mcg Uptravi f.c. tab	Selexipag f.c. tab 600mcg	尚達利膜衣錠600微克	需整粒吞服，不可將藥錠剝半、壓碎或咀嚼，並應以白開水吞服。
CAB04	60mg Cabometyx f.c. tab	Cabozantinib f.c. tab 60mg	癌必定膜衣錠60毫克	必須整粒錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。癌必定膜衣錠屬Hazardous agent，拿取時請戴單層手套。
LIX01	60mg Lixiana f.c. tab	Edoxaban f.c. tab 60mg	里先安膜衣錠60毫克	無法吞服整顆錠劑之病人，可將錠劑壓碎混合於水中或蘋果泥中，立即口服使用；或壓碎後懸浮於少量水中，立即經由由胃管給藥，之後並應以水沖洗。壓碎錠劑在水和蘋果泥中穩定長達4小時。
TRA04	62.5mg Tracleer tab-2nd	Bosentan f.c. tab 62.5mg-2nd	愛可泰隆全可利膜衣錠62.5毫克	需整粒吞服。若無法吞服，於給藥前立即將其分散在最少量的水中立即服用。有可能致畸胎，懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的Bosentan錠劑。
RYB03	7mg Rybelsus tab	Semaglutide tab 7mg	瑞倍適錠7毫克	整顆吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
UPT06	800mcg Uptravi f.c. tab	Selexipag f.c. tab 800mcg	尚達利膜衣錠800微克	需整粒吞服，不可將藥錠剝半、壓碎或咀嚼，並應以白開水吞服。
RET02	80mg Retsevmo hard cap	Selpercatinib cap 80mg	銳癌寧膠囊80毫克	化學治療藥，需整粒吞服。
REQ30	8mg Requip PD tab	Ropinirole prolonged release 8mg	力必平持續性藥效膜衣錠8毫克	為持續性藥效膜衣錠，必須整顆吞服；切勿咀嚼、壓碎或剝半使用。
BS260	8mg/2 Suboxone sublingual	Buprenorphine 8mg, Naloxone 2mg	舒倍生8毫克	舌下錠需置於舌下直到溶化，不可咀嚼或直接吞服，否則會影響其藥效。
ABI07	Abiranat tab 250mg	Abiraterone acetate tab 250mg	阿比拉那錠250毫克	必須整顆以水吞服，請勿壓碎或嚼碎。
ACA03	Acarizax lyophilisate 12 SQ-	Acarizax lyophilisate 12 SQ-	阿克立舌下錠12 SQ-	舌下錠，不可磨粉。

藥碼	螢幕名	學名	中文商品名	磨粉建議
ACE02	ACEO retard cap 90mg	Acemetacin retard cap 90mg	痛立安長效膠囊90公絲	需整粒以水吞服，不可咬破。
AE650	Afinitor tab 5mg	Everolimus tab 5mg	癌伏妥錠5毫克	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有30mL水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以30mL水潤洗容器後服下。
AKY01	Akynzeo cap 300mg/0.5mg	Netupitant300,Palonosetron 0.5mg	嘔可舒膠囊	複方劑型，需整粒吞服。
ALE02	Alecensa cap 150mg	Alectinib cap 150mg	安立適膠囊150毫克	需整粒吞服，切勿打開膠囊或將膠囊內容物溶化使用。
ALF04	AlfacalcidoL soft cap 0.5mcg	AlfacalcidoL soft cap 0.5mcg	愛康鈣軟膠囊0.5微公克	液體軟膠囊，需整粒吞服。
ALG02	AlglutoL tab 333mg	Acamprosate calcium tab 333mg	戒酒妥333毫克腸溶錠	腸溶緩釋錠，須整顆以水吞服，請勿剝半、壓碎或嚼碎。
AMB01	Ambro SR tab 75mg	Ambroxol SR tab 75mg	談舒持續性藥效錠75毫克	Ambro SR為持續性藥效錠，服用時以充分的開水整粒吞服，不可咀嚼。
BM420	AsacoL tab 800mg	Mesalazine tab 800mg	阿腸克錠800毫克	本錠劑必須整粒吞服，不可嚼碎或折半。
ATA01	AtanaaL cap 5mg	Nifedipine cap 5mg	壓達能軟膠囊5毫克	內為油狀物，不宜磨粉，可咬破後吞服。
ATO03	Atozet f.c. tab 10/20mg	Ezetimibe, Atorvastatin 10/20mg	優泰脂膜衣錠10/20毫克	需整粒吞服，不可研碎、溶解或咀嚼使用。
AUB01	Aubagio f.c. tab 14mg	Teriflunomide f.c. tab 14mg	歐博捷膜衣錠14毫克	味道很苦，不建議剝半或磨粉。
AD990	Avodart soft cap 0.5mg	Dutasteride soft cap 0.5mg	適尿通軟膠囊0.5毫克	軟膠囊，須整粒吞服；懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸此膠囊，特別是有裂損的膠囊；因可經由皮膚吸收，可能造成胎兒異常。
BET04	Betmiga PR tab 50mg	Mirabegron PR tab 50mg	貝坦利持續性藥效錠50毫克	可隨餐或空腹服用，應以水整粒吞服，不可嚼碎、切割或壓碎。
BIK01	Biktarvy@ tab 50/200/25mg	BIC, FTC, TAF@ tab 50/200/25mg	吉他韋膜衣錠	需整粒吞服，勿咀嚼、壓碎或剝半。
AD760	BisacodyL enteric f.c. tab 5mg	BisacodyL tab 5mg	秘克的腸溶膜衣錠 5 毫克	磨粉後會破壞腸衣，降低藥效又會造成胃的刺激引起嘔吐。
AB630	Bokey EM cap 100mg	Aspirin EM cap 100mg	伯基腸溶微粒膠囊100毫克	整粒吞服或打開膠囊但不可咬碎或磨碎顆粒。
BRA02	Braftovi cap 75mg	Encorafenib cap 75mg	迫癌癒75毫克膠囊	抗腫瘤藥物，須整粒吞服。
BRI07	Briviact f.c. tab 50mg	Brivaracetam f.c. tab 50mg	必治癲膜衣錠50毫克	請整顆吞服，不建議剝半或磨粉。
BRO01	Broen-C enteric f.c.tab	Bromelain,L-cysteine tab	撲炎喜腸溶膜衣錠	Broen-C為腸溶膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半、嚼碎、磨粉服用。
AZ130	Buprotrin SR 150mg QUIT	Bupropion SR tab 150mg	慮舒妥持續性藥效膜衣錠150毫克	持續釋效錠，應整粒吞服，不可壓碎或嚼碎。
BM350	C.T.L. XR tab 500mg	Metformin XR tab 500mg	驅糖樂持續錠500毫克	可剝半，但不可以壓碎或研磨。磨粉後破壞控制釋放的設計。
CAP03	Capecitabine(Calveda) tab 500mg	Capecitabine tab 500mg	艾卡培(艾結達)膜衣錠500毫克	與水一起整顆吞服，不可壓碎或切割。
AM950	Cellcept cap 250mg	Mycophenolate mofetil cap 250mg	山喜多膠囊250毫克	需整粒吞服；可能致畸胎，避免直接皮膚接觸。
BT580	Cialis f.c. tab 5mg	Tadalafil f.c. tab 5mg	犀利士膜衣錠5毫克	應整顆吞服，不可剝半。
CIB01	Cibinqo f.c. tab 200mg	Abrocitinib f.c. tab 200mg	喜繽果200毫克膜衣錠	錠劑應以水整粒吞服，不得切割、壓碎或嚼碎（非整粒吞服尚未臨床試驗）。
CIP01	Ciprogen f.c. tab 250mg	Ciprofloxacin f.c. tab 250mg	喜博欣膜衣錠250毫克	錠劑應整顆和少量水一起吞服。
BC720	Conslife tab	BisacodyL,Sennoside,DioclyL sod.	秘福糖衣錠	必須整粒吞服，不得咬碎，且服藥前後一小時不得使用制酸劑或牛乳。
CON10	Contrave ER tab 8/90mg	Naltrexone, Bupropion 8/90mg	康纖美持續性釋放錠	持續釋放錠，需整粒吞服，不可剝半、咀嚼或弄碎。
COR04	Cortiment MMX PR tab 9mg	Budesonide MMX PR tab 9mg	可帝敏持續性釋放錠9毫克	持續釋放型藥物需整粒吞服，不可剝半、咬碎或磨粉。
AL640	Cozaar f.c. tab 50mg	Losartan f.c. tab 50mg	可悅您膜衣錠50毫克	宜整粒吞服，可剝半。
CRE03	Creon cap 300mg	Pancreatin cap 300mg	卡利消腸溶微粒膠囊25000	1. 膠囊須於餐中或與點心，或在餐後配合足夠的液體整粒吞服，不可磨碎或咀嚼。須注意不要將藥品滯留於口中，應盡速吞下。 2. 吞服膠囊若有困難時(例如小孩或老人)，可小心打開膠囊，將其中的腸溶微粒加入酸性(pH < 5.5)軟質的食物中，例如蘋果泥或優格，或pH小於5.5的果汁例如蘋果汁、柳橙汁或鳳梨汁。腸溶微粒與食物或液體的混合物應立即服用，不可再儲放。
DEL05	Delstrigo@ tab 100/300/300mg	DOR, 3TC, TDF@ tab 100/300/300mg	達滋克膜衣錠	需整粒吞服（根據 EACS Guidelines, version 10.1, 2020）。
BT410	DetrusitoL SR cap 4mg	Tolterodine L-tartrate cap 4mg	得舒妥持續性藥效膠囊4 毫克	磨粉後破壞控制釋放的設計。
DEX01	Dexilant cap 60mg	Dexlansoprazole cap 60mg	得喜胃通60毫克緩釋膠囊	必須整粒吞服，若無法整粒吞服時可打開膠囊，將藥粉顆粒灑入1湯匙果醬內立刻服下，不可咀嚼藥粉顆粒。
DIA07	Diacomit hard cap 250mg	StiripentoL cap 250mg	戴克癲膠囊250毫克	必須整顆吞服，於餐中以一杯開水配服。不可打開膠囊或壓碎。勿空腹服用。
AD970	Dialicon tab 120mg	Dialicon tab 120mg	加利康錠	內含pancreatin，lipase 故建議整粒吞服。
AG630	Diamicron MR tab 60mg	Gliclazide MR tab 60mg	岱蜜克龍持續性藥效錠60毫克	磨粉後破壞控制釋放的設計。
DIC03	DiceteL f.c. tab 100mg	Pinaverium tab 100mg	得舒特膜衣錠100毫克	整粒吞服，請勿口含或咀嚼。請於用餐時以一大杯開水吞服以避免食道粘膜接觸。躺臥時或就寢前請勿服用。
DOV01	Dovato@ f.c. tab 50/300mg	Dolutegravir,Lamivudine @50/300mg	洛瓦梭膜衣錠	無法吞嚥整顆錠劑的病人，可使用切藥器將藥切成兩半，切開後應立即服用完整的劑量。
BD050	Doxaben XL tab 4mg	Doxazosin XL tab 4mg	可迅持續藥效錠4毫克	需整粒吞服，不可咬碎，分割或磨碎。
AD890	Doxymycin e.c. cap 100mg	Doxycycline cap 100mg	多喜黴素腸溶膠囊100公絲	腸溶微粒膠囊，整顆吞服或可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒，避免對胃部產生刺激性。
DUO01	Duodart cap 0.5/0.4mg	Dutasteride,Tamsulosin 0.5/0.4mg	多適達膠囊0.5/0.4mg	膠囊需整顆吞服，不可咀嚼、碾碎或打開使用。直接接觸硬膠囊內之dutasteride，可能會對口咽部黏膜造成刺激。
DUR07	Durotine cap 60mg	Duloxetine cap 60mg	杜憂停膠囊60毫克	內含腸溶緩釋型小顆粒，應整粒吞服。不可咀嚼或壓碎。勿打開膠囊及將膠囊內容物與食物或液體混和服用。
DUT01	Duta soft cap 0.5mg	Dutasteride cap 0.5mg	尿暢軟膠囊0.5毫克	軟膠囊，須整粒吞服；懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸此膠囊，特別是有裂損的膠囊；因可經由皮膚吸收，可能造成胎兒異常。
DUX01	Duxetine cap 30mg	Duloxetine cap 30mg	萬憂停膠囊30毫克	內含腸溶緩釋型小顆粒，應整粒吞服。不可咀嚼或壓碎。勿打開膠囊及將膠囊內容物與食物或液體混和服用。
EFE01	Effexor XR cap 75mg	Venlafaxine XR cap 75mg	速悅持續性藥效膠囊75毫克	持續性藥效膠囊，必須配開水整顆吞服；切勿咀嚼、壓碎、剝半或放入水中使用。可將膠囊小心打開，將內容物倒在湯匙內與開水一起立即吞服。
ELT01	Eltroxin tab 50mcg	Levothyroxine tab 50mcg	昂特欣錠50微公克	ELTROXIN TAB 必須整顆吞服，不可剝半，而且必須空腹服用(飯前30分至1小時)。若嘗試將錠劑剝半很容易弄碎，且可能產生服用劑量不一致的風險。
EPB01	EpbutoL tab 400mg	EthambutoL tab 400mg	易復癆錠	磨粉後易潮解(請於服用前才磨粉)。
EPC01	Epclusa f.c. tab 400/100mg	Sofosbuvir,Velpatasvir 400/100mg	宜譜莎膜衣錠	本品帶有苦味，建議不要將膜衣錠嚼碎或研碎使用，需整粒吞服。
ERL01	Erleada f.c. tab 60mg	Apalutamide f.c. tab 60mg	安列康膜衣錠60毫克	錠劑需整顆吞服。
AR070	Evista f.c. tab 60mg	Raloxifene f.c. tab 60mg	鈣穩膜衣錠60毫克	不宜磨粉；致畸胎可能(teratogenic potential)，避免皮膚直接接觸。
FEN01	Fenolip-U tab 160mg	Fenofibrate tab 160mg	祛脂優錠160毫克	微粒化劑型；與食物併服，須整粒吞服，勿嚼碎、弄破或搗碎。

藥碼	螢幕名	學名	中文商品名	磨粉建議
FEN03	Fentora buccaL tab 100mcg	Fentanyl buccaL tab 100mcg	吩妥拉口頰錠100微公克	不可將口頰錠切割、粉碎、吸入、咀嚼或整顆吞服，因這會導致血漿濃度比依照指示使用時為低。
AF740	Ferrous Gluco-B tab	Ferro.Gluconate 300mg,Vit.B1+C	維他葡萄糖鐵糖衣錠	此為鐵劑，不宜磨粉。
AF690	Finta f.c. tab 5mg	Finasteride f.c. tab 5mg	快得膜衣錠 5 毫克	懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的Finasteride 錠劑。
FOS01	Fosamax Plus tab 70mg/5600IU	Alendronate 70mg,Vit. D3-5600IU	福善美保骨錠70毫克/5600國際單位	主成分Alendronate對食道黏膜具刺激性，需整粒吞服，不宜剝半、磨粉；服用時須配服一大杯水。由N-G給藥時，可將藥錠以約10mL的水溶解後，立即給藥再以50 mL的水沖N-G管子使藥物完全進入胃內。
FYL01	Fylin retard f.c. tab 400mg	Pentoxifylline f.c. tab 400mg	暢循持續性膜衣錠400毫克	應整粒吞服，不可磨粉。
GEF01	Gefitinib Sandoz f.c tab 250mg	Gefitinib f.c. tab 250mg	基扶能膜衣錠250毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服。若無法整粒吞服時可將藥錠放入半杯飲用水中，攪拌約15分鐘直到藥錠溶解後，立即喝下，再以半杯水沖洗杯子並喝下。此溶液也可經由鼻胃管管灌。
GEN04	Genvoya@ tab 10/200/150/150mg	TAF, FTC, EVG, Cobi@ tab	捷扶康膜衣錠	需整粒吞服，勿咀嚼、壓碎或剝半。
AI130	Glivec f.c. tab 100mg	Imatinib f.c. tab 100mg	基利克膜衣錠100毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服；無法吞服者可將藥錠放入飲用水或蘋果汁中（100 mg 用50mL，400 mg用200 mL）攪拌直到藥錠崩解呈懸浮液，立即喝下，再以半杯水沖洗杯緣服下。
GLY03	Glyxambi f.c. tab 25/5mg	Empagliflozin,Linagliptin 25/5mg	糖順平膜衣錠25/5毫克	不建議磨粉，無臨床相關資料。
GOL01	Golfer cap 20mg	Tegafur,GimeraciL,OteraciL 20mg	剋伏膠囊20毫克	口服化療藥物，不可打開膠囊或嚼碎。
AH250	Hydrea cap 500mg	Hydroxyurea cap 500mg	愛治膠囊500毫克	需整粒吞服。接觸到粉末可能引起嚴重的皮膚毒性，醫療人員給此藥時應帶手套。
AH600	Hyzaar f.c. tab 100/12.5mg	Losartan, Dithiazide 100/12.5mg	好悅您膜衣錠100/12.5毫克	複方劑型，宜整粒吞服。
IMB01	Imbruvica cap 140mg	Ibrutinib cap 140mg	億珂膠囊140毫克	Ibrutinib膠囊必須整顆吞服，不可以打開、敲碎或咀嚼。
INO01	Inovelon f.c. tab 400mg	Rufinamide f.c. tab 400mg	克雷葛膜衣錠400毫克	應隨餐服用，若患者吞嚥困難，可將錠片壓碎並放入半杯水中服用。或利用刻痕線將錠片均分成兩半。
AG480	Iressa f.c. tab 250mg	Gefitinib f.c. tab 250mg	艾瑞莎膜衣錠250公絲	為口服抗癌藥，應整粒吞服。若無法整粒吞服時可將藥錠放入半杯飲用水中，攪拌約15分鐘直到藥錠溶解後，立即喝下，再以半杯水沖洗杯子並喝下。此溶液也可經由鼻胃管管灌。
XR520	Isentress@ f.c. tab 400mg	Raltegravir@ tab 400mg	宜昇瑞膜衣錠400毫克	膜衣錠需整粒吞服，因The bioavailability of the chewable tablet is higher: 300 mg chewable tablet (= 400 mg film-coated tablet)
ISO05	Isoptin SR f.c. tab 240mg	VerapamiL SR tab 240mg	心舒平持續性膜衣錠 240毫克	應整粒吞服，不可敲碎或嚼碎。
ISO03	IsormoL tab 20mg	Isosorbide 5-Mononitrat tab 20mg	愛速脈錠20毫克	仿單：不可咬碎。
IVI02	Ivic f.c. tab 100mg	Imatinib f.c. tab 100mg	癌微可膜衣錠100毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服；無法吞服者可將藥錠放入飲用水或蘋果汁中（100 mg 用50mL，400 mg用200 mL）攪拌直到藥錠崩解呈懸浮液，
JUL01	Juluca@ f.c. tab 50/25mg	Dolutegravir, Rilpivirine@ tab 50/25mg	滋若愷膜衣錠	需整粒吞服（根據 EACS Guidelines, version 10.1, 2020）。
AT590	Juvela-N soft cap 200mg	TocopheroL soft cap 200mg	高育維軟膠囊200毫克	不宜磨粉。
KIS02	Kisqali f.c. tab 200mg	Ribociclib f.c. tab 200mg	擊癌利200毫克膜衣錠	Ribociclib 藥錠應整顆吞服(吞服前不可咀嚼、壓碎或剝開藥錠)。藥錠若裂開、破碎或不完整，請勿服用。
KRE01	Kremezin tab 500mg*4/pkg	SphericaL absorptive carbon 2Gm	克裏美淨速崩錠500毫克	在高溫下氧化還原球型活性碳而得到之球狀具吸附力之碳，需直接服用，不可以再磨粉。
BS390	Kuvan soluble tab 100mg	Sapropterin soluble tab 100mg	酷方100毫克	水溶性錠易受潮，不適合磨粉儲存，使用前溶於水服用。
LEA01	Leavdo cap 10mg	Lenalidomide cap 10mg	瑞伏駭膠囊10毫克	有致畸胎性，必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊。
LES01	Lesiton cap 5mg	Dihydroergotamine cap 5mg	樂息痛膠囊5毫克	持續釋放膠囊，需整粒吞服，磨粉後破壞控制釋放的設計，不可剝半或磨粉。
LIP07	Lipanthyl f.c. tab 160mg	Fenofibrate f.c. tab 160mg	弗尼利脂寧160毫克膜衣錠	因Lipanthyl Supra 160mg是由膜衣包覆的錠劑，含有160mg微粒化的fenofibrate；不建議磨粉。
LOR03	Lorviqua tab 25mg	Lorlatinib f.c. tab 25mg	瘤利剋膜衣錠25毫克	必須以至少240mL的水完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎或剝半。
LYN02	Lynparza f.c. tab 150mg	Olaparib f.c. tab 150mg	令癌莎膜衣錠150毫克	必須完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎、溶解或剝半。
BM340	Lysodren tab 500mg	Mitotane tab 500mg		為化療藥品，不可以壓碎或磨粉，拿取時應做好防護措施(例如帶手套)。
MAV02	Mavenclad tab 10mg	Cladribine tab 10mg	瑪威克錠10毫克	須整顆藥搭配水吞服，不可剝半、研磨或咀嚼。
MAV01	Maviret f.c. tab 100mg/40mg	Glecaprevir,Pibrentasvir 100/40mg	艾百樂膜衣錠100毫克/40毫克	需整粒吞服，要服用時才將藥物從包裝中取出。
MAY01	Mayzent f.c. tab 2mg	Siponimod f.c. tab 2mg	美芬太2毫克膜衣錠	需整粒吞服，不可研磨、剝半、咀嚼。
MEG01	Megazon PR tab 50mg	Quetiapine PR tab 50mg	美加柔持續藥效膜衣錠 50毫克	必須整粒吞服，不可以剝半、咀嚼、或壓碎。
MEK01	Mekinist f.c. tab 2mg	Trametinib f.c. tab 2mg	麥欣霓膜衣錠2毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
MET17	Metacu cap 300mg	Trientine HCL cap 300mg	解銅膠囊300毫克	應整粒吞服，不可以打開或咀嚼，因其成分對黏膜有刺激性。
MEZ01	Mezavant XL tab 1200mg	Mesalazine XL tab 1200mg	"安適凡特"長效腸溶膜衣錠1200毫克	必須整粒吞服，不可嚼碎或剝半。
MIR05	Mirtazapine f.c. tab 30mg	Mirtazapine tab 30mg	彌鬱停膜衣錠30毫克	可剝半可磨粉。
AT420	Muaction SR tab 100mg	TramadoL SR tab 100mg	妙而通持續釋放錠100毫克	磨粉後破壞控制釋放的設計。
AM980	Myfortic tab 180mg	Mycophenolate tab 180mg	睦體康180毫克腸衣錠	需整粒吞服；可能致畸胎，避免直接皮膚接觸。
NEP01	Nephoxil cap 500mg	Ferric citrate cap 500mg	拿百磷膠囊500毫克	需整粒吞服，不應剝開或磨碎（因會使嘴巴和牙齒變色）。
NER01	Nerlynx tab 40mg	Neratinib tab 40mg	賀儷安膜衣錠40毫克	需整粒吞服，不可以剝半、咬碎、咀嚼。
AS670	Nexavar f.c. tab 200mg	Sorafenib f.c. tab 200mg	蕾莎瓦膜衣錠200毫克	應整顆吞服鼻胃管病人使用，不可直接磨粉，請將整顆錠劑放入冷白開水中攪拌崩解後立刻服用，再以半杯水沖洗杯緣服下。
AE320	Nexium tab 40mg	Esomeprazole tab 40mg	耐適恩錠40公絲	必需整顆吞服，不要咀嚼、或壓碎藥錠。由N-G 給藥 時，可將藥錠放入50 ml 水中, 不可使用其他液體，以免腸衣膜被破壞；待藥錠溶解後，立即或於30 分鐘內 由N-G 給藥，再以至少30 ml 的水沖N-G 管子使藥物 完全進入胃內。
NIF01	Nifedipine SR f.c. tab 30mg	Nifedipine SR f.c tab 30mg	恆脈循持續性膜衣錠30毫克	持續釋放錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
AN360	Nitrostat tab 0.6mg 25's	Nitroglycerin tab 0.6mg 25's	耐絞寧錠0.6毫克	不可磨粉或直接吞服，只適於舌下使用。
NOR01	Norina tab 5mg	Norethindrone acetate tab 5mg	諾莉娜錠5毫克	不建議磨粉，應整粒吞服(仿單)
NUB02	Nubeqa tab 300mg	Darolutamide f.c. tab 300mg	諾博戈膜衣錠300毫克	建議與食物併服並吞服整顆藥，不可剝半、咬碎或研磨。
NUM01	Numient ER cap 48.75/195mg	Carbidopa,Levodopa 48.75/195mg	瑞多寧緩釋膠囊 48.75/195毫克	應整顆吞服，不可咀嚼或壓碎。吞嚥膠囊有困難者，可打開膠囊後將內容物撒在少量軟性食物上（例如蘋果醬、優格或布丁）立即服用，但不可咀嚼或壓碎小顆粒。
ODE01	Odefsey@ tab 200/25/25mg	Emtricitabine,Rilpivirine,TAF@ 200/25/25mg	安以斯膜衣錠	需整粒吞服，不可嚼碎、磨碎或剝開。
OFE01	Ofev soft cap 150mg	Nintedanib ethanesulfonate 150mg	抑肺纖軟膠囊150毫克	味道很苦，請整粒吞服。
OLU01	Olumiant f.c. tab 4mg	Baricitinib f.c. tab 4mg	愛滅炎膜衣錠4毫克	不可剝半，應整顆服用。對於無法吞嚥整顆錠劑的病人，有3種方式給藥(請參考仿單及民眾用藥指導單)。

藥碼	螢幕名	學名	中文商品名	磨粉建議
OMA01	Omacor soft cap 1000mg	Omega-3-acid ethyl esters 90	脂妙清軟膠囊1000毫克	軟膠囊需整顆吞服。
OPS01	Opsumit f.c. tab 10mg	Macitentan f.c. tab 10mg	傲朴舒膜衣錠10毫克	膜衣錠應以開水整錠吞服；不可以剝半、弄碎或嚼碎。
OSE01	Oseni tab 25/30mg	Alogliptin, Pioglitazone 25/30mg	歐欣尼膜衣錠25/30毫克	Oseni應每日一次，隨餐或空腹後服用。必須整錠吞服，不可剝開。
AO330	Oxbu extended-release tab 5mg	Oxybutynin ER tab 5mg	歐舒緩釋錠5毫克	持續釋放錠，應整粒吞服，不能咀嚼或壓碎，可剝半使用。
OXY01	OxyNorm IR cap 5mg	Oxycodone IR cap 5mg	奧諾美5毫克速效膠囊	1. 需整粒吞服，若切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解後，將導致藥物迅速釋出，進而提高用藥過量與死亡的風險。 2. 遇無法將整粒膠囊吞下者，可將膠囊內容物撒在柔軟食物上（如冰淇淋，布丁，優格）後立即吞下，再喝水潤口確保所有藥物皆服下。 3. 遇N-G feeding或gastrostomy者先以水加入管路，打開膠囊將內容物直接倒入管路，接著用15mL水沖洗管路，再以10mL水多沖洗 2次以上。也可以用牛奶或液態營養補充物取代水。(micromedex)
OZA01	Ozapex OD tab 5mg	Olanzapine OD tab 5mg	悠悅平口溶錠5毫克	不建議,可溶解於水中服用。
PAX01	Paxlovid	Nirmatrelvir 150,Ritonavir 100mg		需整顆吞服，不得咀嚼、分開或壓碎。 若確實需管灌給藥的話，可參考廠商提供的「Paxlovid經管灌給藥資料_1111007-2022/10、Paxlovid 經管灌給藥用藥指導單張 2022/10」方式處理，但廠商聲明「Paxlovid 錠劑未被核准經由管灌給藥。輝瑞不建議以這種方式使用 Paxlovid」。
PLU01	PlusDmax tab 70mg/2800IU	Alendronate 70mg,Vit. D3-2800IU	杏節挺錠	主成分Alendronate對食道黏膜具刺激性，需整粒吞服，不宜剝半、磨粉；服用時須配服一大杯水。 由N-G給藥時，可將藥錠以約10mL的水溶解後，立即給藥再以50 mL的水沖N-G管子使藥物完全進入胃內。
PRE11	Prevymis f.c. tab 240mg	Letermovir f.c. tab 240mg	滅巨斯膜衣錠240毫克	可隨食物或不隨食物服用，需整粒吞服不可嚼碎。
AF200	Propecia f.c. tab 1mg	Finasteride f.c. tab 1mg	柔沛膜衣錠1毫克	懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的Finasteride 錠劑。
QTE01	Qtern f.c. tab 5/10mg	Saxagliptin,Dapagliflozin 5/10mg	控糖穩膜衣錠5毫克/10毫克	請整錠吞服，勿壓碎、切開或咀嚼。
QUE01	Quelip XR tab 200mg	Quetiapine XR tab 200mg	潰益平持續性藥效膜衣錠200毫克	必須整粒吞服，不可以剝半、咀嚼、或壓碎。
RAL02	Ralo f.c. tab 60mg	Raloxifene f.c. tab 60mg	樂骨康膜衣錠60毫克	不宜磨粉；致畸胎可能(teratogenic potential)，避免皮膚 直接接觸。
RHY01	Rhynorm f.c. tab 150mg	Propafenone f.c. tab 150mg	律諾膜衣錠150毫克	具苦味和表面麻醉的作用，應整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼。
RIB02	Ribarin cap 200mg	Ribavirin cap 200mg	摩舒肝清膠囊	請與食物併服，需整粒吞服不可嚼碎。
RIN05	Rinvoq ER tab 15mg	Upadacitinib ER tab 15mg	銳虎持續性藥效錠15毫克	需整粒吞服，不可剝半、攪碎或咀嚼。
AI590	Roaccutane soft gelatin cap 20mg	Isotretinoin cap 20mg	羅可坦軟膠囊20毫克	具黏膜刺激性及致畸胎性，不宜磨粉或咀嚼。
ROZ02	Rozlytrek hard cap 200mg	Entrectinib hard cap 200mg	羅思克200毫克膠囊	膠囊應整顆吞服。不可打開、壓碎、咀嚼或溶解內容物。若忘記服用一次劑量，應補服劑量，除非距離下次服藥時間已不到 12 小時。 若在服藥後立刻嘔吐，應補服該次劑量。
RYD01	Rydapt soft cap 25mg	Midostaurin soft cap 25mg	療德妥軟膠囊25毫克	屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套），必須整顆吞服，不可以敲碎或磨粉。
AP440	Rytmonorm f.c. tab 150mg	Propafenone f.c tab 150mg	心利正膜衣錠150毫克	具苦味和表面麻醉的作用，應整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼。
SAL05	Salazine tab 500mg	Sulfasalazine tab 500mg	撒樂腸溶錠500毫克	腸溶錠勿咬碎，磨粉後會對胃腸道產生刺激性。
BD240	Sprycel f.c. tab 50mg	Dasatinib f.c. tab 50mg	柏萊膜衣錠 50 毫克	需整粒吞服；有可能致畸胎。
BS060	Stalevo tab 100/25/200mg	Levodopa, Carbidopa, Entacapone	始立膜衣錠100/25/200毫克	複方製劑，不宜磨粉。
STI02	Stivarga f.c. tab 40mg	Regorafenib f.c. tab 40mg	癌瑞格膜衣錠40毫克	須整粒吞服，勿嚼碎、弄破或搗碎。
BS320	Stroccain tab	Oxethazaine 5mg, Polymigel 244mg	息痛佳音錠	內含麻醉性止痛成分，應整粒吞服，不可咀嚼或 咬碎以免產生麻木感。
AS530	Sutent cap 12.5mg	Sunitinib cap 12.5mg	紓癌特膠囊12.5毫克	須整粒吞服不可以打開、壓碎、或咀嚼。
SYM02	Symtuza@ tab 800/150/200/10mg	DRV, Cobi, FTC, TAF@ tab	信澤力膜衣錠	無法吞嚥整顆錠劑的病人，可使用切藥器將藥切成兩半，切開後應立即服用完整的劑量。
TAB01	Tabrecta tab 200mg	Capmatinib f.c. tab 200mg	泰芮塔200毫克膜衣錠	需整顆吞服，請勿剝半、研磨或咀嚼；壓碎。
TAF01	Tafinlar hard cap 75mg	Dabrafenib hard cap 75mg	泰伏樂膠囊75毫克	屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套）。膠囊應以水整粒吞服，勿嚼碎、弄破、或打開。
TAG03	Tagrisso tab 80mg	Osimertinib tab 80mg	泰格莎膜衣錠80毫克	1.屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套、穿防護衣）。 2.錠劑必須整顆吞服，不可以敲碎或磨粉。 3.遇吞嚥困難病人，可將錠劑加入50mL白開水，攪拌均勻使崩散後立刻喝下或從N-G管灌；再以120至240mL白開水潤洗杯子後，立即喝下或從N-G管灌。
TAL03	Talzenna cap 0.25mg	Talazoparib cap 0.25mg	達勝癌膠囊0.25毫克	1. 抗癌藥物，需整粒吞服，請勿打開或溶解。 2. 如果發生嘔吐或漏服一劑藥物，不應服用額外的劑量，應依照正常時間服用下一個處方劑量。
TAM05	Tamso SR cap 0.2mg	Tamsulosin HCL SR cap 0.2mg	替你坦舒持續釋放膠囊0.2毫克	不宜磨粉，劑型為持續釋放膠囊，破壞劑型可能會影響其藥動學。
TEC06	Tecfidera hard cap 240mg	Dimethyl fumarate cap 240mg	泰福德膠囊240毫克	腸溶衣膠囊應整粒吞服，不要壓碎、溶解、拆開或咀嚼，避免腸道刺激。
AT130	TegretoL CR tab 200mg	Carbamazepine CR tab 200mg	癲通長效膜衣錠200毫克	磨粉後破壞控制釋放的設計，造成血中濃度不穩定，但可剝半。
AB680	Temgesic sublingual tab 0.2mg	Buprenorphine tab 0.2mg	丁基原啡因舌下錠0.2毫克	使用時應置於舌下，不可咀嚼或吞服。
TEP02	Tepmetko tab 225mg	Tepotinib tab 225mg	德邁特膜衣錠225毫克	應整粒吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
TWY10	Twynsta tab 80/5mg	Telmisartan, Amlodipine 80/5mg	倍必康平錠80/5毫克	錠劑具吸濕性，從鋁箔片取出後，應整顆立即吞服；磨粉後易潮解，且需避免潮濕與光照。
AL450	Tykerb f.c. tab 250mg	Lapatinib f.c. tab 250mg	泰嘉錠250毫克膜衣錠	應整顆吞服，不可以咀嚼、剝半或磨粉。
AU040	Ufur cap	Tegafur 100mg, Uracil 224mg	友復膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
AV320	Valcyte f.c. tab 450mg	Valganciclovir f.c. tab 450mg	克毒癒膜衣錠450毫克	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎，致畸胎可能；避免直接 皮膚接觸。
VER03	Verquvo f.c. tab 10mg	Vericiguat micronized tab 10mg	偉卡沃10毫克膜衣錠	需整粒吞服，對於無法吞服整顆藥錠的病人，可在服藥前將藥品磨碎，並立即與水混和服用。
VER01	Verzenio tab 150mg	Abemaciclib f.c. tab 150mg	捷癌寧膜衣錠150毫克	應整顆吞服，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服。
BS500	Vesicare f.c. tab 5mg	Solifenacin succinat tab 5mg	衛喜康膜衣錠5毫克	不宜磨粉，需整粒吞服（因味苦具刺激性）。
VET01	Vetawon f.c. tab 5mg	Tadalafil f.c. tab 5mg	佳倍壯膜衣錠5毫克	應整顆吞服，不可剝半。
VIN03	Vinobin softgel cap 20mg	Vinorelbine softgel cap 20mg	威若賓20毫克軟膠囊	軟膠囊為口服抗癌藥；必須在餐時以水整顆吞服(不可嚼食或剝開膠囊)。
VOL01	Volibris f.c. tab 10mg	Ambrisentan f.c. tab 10mg	肺博舒 10 毫克膜衣錠	Ambrisentan 錠劑不可剝開、研碎或嚼碎。
BP590	Votrient f.c. tab 200mg	Pazopanib f.c. tab 200mg	福退癌膜衣錠200毫克	需整粒空腹服用，不可剝半或磨粉。請勿壓碎藥錠，因為可能會增加吸收速率而影響全身暴露量。
AFI10	Votubia tab 2.5mg	Everolimus tab 2.5mg	愛服妥錠2.5毫克	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。 若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有30mL水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以30mL水潤洗容器後服下。
VYN01	Vyndamax soft cap 61mg	Tafamidis soft cap 61mg	維萬心軟膠囊61毫克	軟膠囊需整顆吞服，不可壓碎或切開。
AB850	Wellbutrin XL tab 150mg	Bupropion XL tab 150mg	威克倦持續性藥效錠150毫克	Wellbutrin XL為持續釋放錠，應整粒吞服，不可壓碎或嚼碎。
XAN02	Xanthium cap 200mg	Theophylline cap 200mg	善寧持續性藥效膠囊200公絲	不可嚼碎或壓碎其內顆粒。
AC830	Xeloda tab 500mg	Capecitabine tab 500mg	截瘤達錠500毫克	與水一起整顆吞服，不可壓碎或切割。

藥碼	螢幕名	學名	中文商品名	磨粉建議
XIG01	Xigduo XR tab 10/1000mg	Dapagliflozin, Metformin 10/1000	釋多糖持續藥效膜衣錠10/1000毫克	XIGDUO XR錠必須整粒吞服，切勿磨碎、切割或嚼碎。
XOS01	Xospata f.c. tab 40mg	Gilteritinib fumarate tab 40mg	適加坦膜衣錠40毫克	須整顆吞服。
XTA01	Xtandi soft cap 40mg	Enzalutamide cap 40mg	安可坦軟膠囊40毫克	屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套）。膠囊應以水整粒吞服，勿嚼碎、弄破、打開或融化。
ZCO01	Zcough soft cap 100mg	Benzonatate soft cap 100mg	咳治得軟膠囊100毫克	若咬碎膠囊，會使口腔粘膜局部麻醉而有梗塞感。
ZEJ01	Zejula cap 100mg	Niraparib cap 100mg	截永樂膠囊	必須整顆吞服，不可咀嚼，壓碎或撥開。
ZEP03	Zeposia cap 0.92mg	Ozanimod HCL cap 0.92mg	捷保舒膠囊0.92毫克	膠囊必須完整吞服，可隨餐或空腹服用。
ZYK01	Zykadia cap 150mg	Ceritinib cap 150mg	立克嘉膠囊150毫克	膠囊應整顆配水吞服，不可咬碎或磨粉。
ZYT01	Zytiga tab 250mg	Abiraterone Acetate tab 250mg	澤珂錠250毫克	必須整顆以水吞服，請勿壓碎或嚼碎。
AV440	(EM) 50mg Voren cap	Diclofenac EM cap 50mg	非炎腸溶微粒膠囊50毫克	腸溶微粒膠囊，可打開膠囊， 但不可嚼碎顆粒，避免對胃部產生刺激性。
ZYP01	(口溶) Zyprexa Zydis OD tab 5mg	Olanzapine Zydis OD tab 5mg	津普速口溶錠5毫克	不建議, 可溶解於水中服用。
TRO04	200mg Trokendi XR cap	Topiramate XR cap 200mg	妥偏停持續性釋放膠囊200毫克	1. 本院Topiramate有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. 本院Topiramate分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。 立刻吞服此藥物 /食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。 3. 此藥為持續性釋放膠囊，不可以拆開需整粒服用。
BA710	25mg Strattera cap	Atomoxetine cap 25mg	思銳膠囊25毫克	藥品具有刺激性，建議整粒吞服。
PRA03	75mg Pradaxa cap	Dabagatran etexilate cap 75mg	普栓達膠囊75毫克	膠囊必需整顆吞服，不可咀嚼、撥開或壓碎；因可能導致藥物暴露量增加，使得出血風險增加。
ASP01	Aspirin f.c. tab 100mg	Aspirin f.c. tab 100mg	阿斯匹林膜衣錠	磨粉後易潮解(可服用前才磨粉)。
CON09	Const-K ER tab 750mg	Potassium chloride ER tab 750mg	康是鈣持續性藥效錠750毫克	持續藥效錠需整粒吞服，不可剝半、咬破或咀嚼，請與食物一起併服降低腸胃刺激。
AZ170	CR Stilnox tab 6.25mg	Zolpidem tartrate tab 6.25mg	使蒂諾斯長效錠6.25毫克	為一種兩層的加衣長效錠，其中一層會快速釋出藥物成分，另一層則會緩慢釋出藥物成分。不宜磨粉，需整粒吞服，不可折半、壓碎或咀嚼。
HIR02	Hiros S.R.M. cap 5/120mg	Cetirizine,Pseudoephedrine 5/120	喜洛緩釋微粒膠囊	此為緩釋微粒膠囊，建議整粒吞服或打開膠囊但不可咬碎或磨碎顆粒。
LAN05	Lanapine OD tab 10mg	Olanzapine OD tab 10mg	樂安神口溶錠10毫克	不建議, 可溶解於水中服用。
AP630	Phyllocontin tab 225mg	Aminophylline tab 225mg	菲康汀持續性藥效錠	可剝半但不能咀嚼碎或壓碎，以免其中Aminophylline快速釋出，可能造成毒性。（依據仿單）
SOL06	Solinacin f.c. tab 5mg	Solifenacin f.c. tab 5mg	利平順膜衣錠5毫克	本品帶有苦味，建議不要將膜衣錠嚼碎或研碎使用，需整粒吞服。
AM010	HBS Madopar-125mg	L-DOPA 100MG+ BENSERAZIDE 25MG	美道普持續藥效膠囊	應整粒吞服，打開膠囊給藥會破壞控制釋放的設計。 Madopar HBS 進入胃內， 外部膠囊殼破裂後，與 Madopar 藥物相混合的賦型劑之一 hydrocolloid 會將 Madopar 包覆形成一膠狀物，慢慢使之釋放出來；以維持穩定之血中濃度。
BP430	Protase cap 280mg	Pancrelipase cap 280mg	優妙化腸溶微粒膠囊	整粒吞服，可打開膠囊但不可磨碎。
STR01	(Free) 10mg Strattera cap	Atomoxetine cap 10mg	思銳膠囊10毫克	藥品具有刺激性，建議整粒吞服。
NIN01	(Free) 2.3mg Ninlaro cap	Ixazomib cap 2.3mg		整顆膠囊以水送服，不可壓碎、咀嚼或打開膠囊。
NIN02	(Free) 3mg Ninlaro cap	Ixazomib cap 3mg		整顆膠囊以水送服，不可壓碎、咀嚼或打開膠囊。
KIS01	(Free) Kisqali tab 200mg	Ribociclib f.c. tab 200mg	擊癌利200毫克膜衣錠	Ribociclib 藥錠應整顆吞服(吞服前不可咀嚼、壓碎或剝開藥錠)。藥錠若裂開、破碎或不完整，請勿服用。
LYN01	(Free) Lynparza cap 50mg	Olaparib cap 50mg		必須完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎、溶解或剝半。
AC210	(口) Ciproxin tab 250mg	Ciprofloxacin f.c. tab 250mg	速博新膜衣錠250毫克	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半。
CUR04	(口) Curam f.c. tab 1000mg	Amoxicillin 875mg, Clav 125mg tab	諾快寧膜衣錠1000毫克	錠劑需整顆吞服，不可咀嚼。如有需要可將錠劑分開成兩半以利吞服，但不可咀嚼。 因若磨粉容易吸潮，加上 clavulanic acid 對潮濕敏感，藥效降解速度快，故不建議磨粉及泡水分次使用。
UNA01	(口) Unasyn tab 375mg	Sultamicillin tosylate tab 375mg	優耐迅口服錠劑	錠劑需整顆吞服，不可咀嚼。 如有需要可將錠劑分開成兩半以利吞服，但不可咀嚼。因若磨粉容易吸潮，加上 clavulanic acid 對潮濕敏感，藥效降解速度快，故不建議磨粉及泡水分次使用。
FM100	(口)(XL) 60mg Morphine cap	Morphine sulfate cap 60mg	默痛舒持續性藥效膠囊60毫克	1.默痛舒膠囊用法為每24小時服用一次，應整粒膠囊吞服，請勿壓碎或嚼碎膠囊及其小顆粒。 2.對於使用管灌餵食病人，可以打開膠囊，將內含的小顆粒撒於流質或不含酒精的冷飲料中給與管灌；但絕對不可以加入白開水或生理食鹽水中，以免凝結成塊。
SEL02	(專案) 40mg Selpercatinib cap	Selpercatinib(LY3527723) cap40mg		化學治療藥，需整粒吞服。
ALP02	(專案) 50mg Alpelisib tab	Alpelisib tab 50mg		需整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
BS370	(專案) Diacomit cap 250mg	Stiripentol cap 250mg		必須整顆吞服，於餐中以一杯開水配服。不可打開膠囊或壓碎。勿空腹服用。
ENT06	(專案) Entrectinib cap 200mg	Entrectinib cap 200mg		屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套）。膠囊應以水整粒吞服，勿嚼碎、弄破、打開或融化。
HYD12	(專案) Hydrine cap 500mg	Hydroxyurea cap 500mg		需整粒吞服。接觸到粉末可能引起嚴重的皮膚毒性，醫療人員給此藥時應帶上手套。
ROZ05	(專案) Rozlytrek cap 200mg	Entrectinib cap 200mg		膠囊應整顆吞服。不可打開、壓碎、咀嚼或溶解內容物。 若忘記服用一次劑量，應補服劑量，除非距離下次服藥時間已不到 12 小時。若在服藥後立刻嘔吐，應補服該次劑量。
TRO06	(專案) TrolovoL tab 300mg	D-Penicillamine tab 300mg		不宜磨粉。
VIG02	(專案)Vigabatrin oral soln 500mg	Vigabatrin powder 500mg		1. 將每包 500 毫克的內容物倒入乾淨的杯子中，並用 10 毫升冷水或室溫水溶解；最終濃度為 50 mg/mL。 2. 如果配置的溶液不透明（或不含顆粒）且無色，請將其丟棄。配置後的溶液應立即使用，剩餘未使用的部分應丟棄。 3. 使用藥物隨附的 3 mL 或 10 mL 口服注射器給藥。
KRE10	(顆粒) Kremezín granules 2Gm/pkg	SphericalL absorptive carbon 2Gr	克裏美淨細粒	在高溫下氧化還原球型活性碳而得到之球狀具吸附力之黑色球型小顆粒，需直接服用，不可以再磨粉。
ADE06	1mg Adempas f.c. tab	Riociguat f.c. tab 1mg	愛定保肺膜衣錠1毫克	不可剝開、研碎或嚼碎。
POM01	2mg Pomalyst cap	Pomalidomide cap 2mg	鉑美特膠囊2毫克	Pomalyst 膠囊必須整粒吞服，請勿壓碎、咀嚼或打開膠囊。
BS250	2mg/0.5 Suboxone sublingual tab	Buprenorphine 2mg, Naloxone 0.5mg	舒倍生 2 毫克	舌下錠需置於舌下直到溶化，不可咀嚼或直接吞服，否則會影響其藥效。
BA720	40mg Strattera cap	Atomoxetine cap 40mg	思銳膠囊40毫克	藥品具有刺激性，建議整粒吞服。
DES02	8mg/2 Desud Plus sublingual	Buprenorphine 8mg, Naloxone 2mg	解佳益舌下錠	舌下錠需置於舌下直到溶化，不可咀嚼或直接吞服，否則會影響其藥效。
ACA01	Acamprosate calcium tab 333mg	Acamprosate calcium tab 333mg	阿坎酸鈣333毫克緩釋錠	腸溶緩釋錠，須整顆以水吞服，請勿剝半、壓碎或嚼碎。
ALV02	Alvotinib f.c. tab 400mg	Imatinib f.c. tab 400mg	艾亭寧膜衣錠400毫克	為口服抗癌藥，應整粒吞服；無法吞服者可將藥錠放入飲用水或蘋果汁中（100 mg 用50mL，400 mg用200 mL）攪拌直到藥錠崩解呈懸浮液，立即喝下，再以半杯水沖洗杯緣服下。
XAT01	Atripla@ tab 600/200/300mg	Efavirenz,Emtricitabin, Tenofovir	亞翠佩膜衣錠	需整粒吞服（根據 EACS Guidelines, version 10.1, 2020）。
BIN01	Binosto effervescent tab 70mg	Alendronate effervescent tab 70mg	骨密妥發泡錠	此發泡錠需溶於120西西白開水，發泡停止後等待至少5分鐘，攪拌10秒後喝下，不可嘗試吞食、咀嚼、或吸食發泡錠，因為可能會造成口咽部潰瘍。 請於當天首次進食、服用飲料、或其他藥物至少30分鐘之前喝完口服液劑。服用完骨密妥發泡錠後至少30分鐘及至當天首次進食前，請避免躺臥。
AD450	Cardizem retard tab 90mg	Diltiazem retard tab 90mg	凱帝心徐放錠90公絲	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
CHO01	Cholbam cap 50mg	Cholic acid cap 50mg	酷立酸膠囊50毫克	應跟食物一起服用。不要壓碎或咀嚼膠囊。不能吞嚥膠囊的病人，可以將膠囊打開並將其內容物混入嬰
CIN01	Cinolone f.c. tab 250mg	Ciprofloxacin f.c. tab 250mg	信諾隆膜衣錠250毫克	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半。

藥碼	螢幕名	學名	中文商品名	磨粉建議
COM03	Complera@ f.c. tab 200/25/300mg	FTC, RPV, TDF@ tab 200/25/300mg	康普萊膜衣錠	需整粒吞服，不可以壓碎或溶於液體中，因 RPV不溶於水。
BD250	Cymbalta cap 30mg	Duloxetine cap 30mg	千憂解30毫克	內含腸溶緩釋型小顆粒，應整粒吞服。不可咀嚼或壓碎。勿打開膠囊及將膠囊內容物與食物或液體混和服用。
XED01	Edurant@ f.c. tab 25mg	Rilpivirine@ tab 25mg	恩臨膜衣錠25毫克	需整粒吞服，不可以壓碎或溶於液體中，因 RPV不溶於水。
GLU10	Glucomin X.R. tab 500mg	Metformin XR tab 500mg	立克醣緩釋錠500毫克	可剝半，但不可以壓碎或研磨。磨粉後破壞控制釋放的設計。
ICL01	Iclusig f.c. tab 15mg	Ponatinib f.c. tab 15mg	英可欣膜衣錠15毫克	可與食物一起服用或單獨服用，應整錠吞服。不可壓碎或溶解錠劑。
AI680	Imdur CR tab 60mg	Isosorbide 5-mononitrat tab 60mg	寬心持續性藥效錠60公絲	可剝半，不宜磨粉，磨粉後破壞控制釋放的設計。
XK110	Kaletra@ tab 200/50mg	Lopinavir, Ritonavir@ 200/50mg	快利佳錠	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
KEP10	Kepinton S.R. cap 200mg	Ketoprofen S.R. cap 200mg	可平痛緩釋膠囊200毫克	Ketoprofen SR capsules為緩釋膠囊，須整粒吞服，膠囊內的小顆粒不可以磨粉。
XK300	Kivexa@ f.c. tab 600/300mg	Abacavir, Lamivudine @ 600/300mg	克為滋膜衣錠	需整粒吞服（根據 EACS Guidelines, version 10.1, 2020）。
KMY01	K-mycin f.c. tab 500mg	Clarithromycin f.c. tab 500mg	克那每欣膜衣錠500毫克	有特殊味道，建議整粒吞服。
MIR01	Mirtapine OD tab 30mg	Mirtazapine OD tab 30mg	美妥平口溶錠30毫克	口溶錠應置於口中，它會迅速分散於唾液中、故容易吞服。
NIN03	Ninlaro cap 4mg	Ixazomib cap 4mg	免瘤諾膠囊4毫克	顆膠囊以水送服，不可壓碎、咀嚼或打開膠囊。
NOB01	Nobelin XR f.c. tab 750mg	Levetiracetam XR f.c. tab 750mg	意必寧持續錠750毫克	持續釋放膜衣錠，磨粉後破壞控制釋放的設計，不可剝半或磨粉。
PAN01	Panho enteric f.c. tab 40mg	Pantoprazole tab 40mg	盼胃好腸溶膜衣錠	磨粉後破壞腸衣，故建議整粒吞服。宜餐前一小時空腹服用。
RAB01	Rabe tab 20mg	Rabeprazole tab 20mg	止潰腸溶膜衣錠20毫克	本藥為腸溶膜衣錠，不宜嚼碎或壓碎，應整顆吞服。
ROZ01	Rozerem tab 8mg	Ramelteon tab 8mg	柔速瑞膜衣錠8毫克	仿單建議，務必整粒吞服。
SUP05	Superocin f.c. tab 250mg	Ciprofloxacin f.c. tab 250mg	速倍樂膜衣錠250毫克	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半。
TAM06	Tamokas PR tab 0.4mg	Tamsulosin PR tab 0.4mg	益利舒持續性藥效膜衣錠0.4毫克	為持續性藥效膜衣錠，必須整粒吞服不可磨碎或咀嚼。
TOP03	Topaless f.c. tab 100mg	Topiramate f.c. tab 100mg	癲除膜衣錠100毫克	1. Topiramate有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。 立刻吞服此藥物 /食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。
BT390	Trientine cap 300mg	Trientine cap 300mg		應整粒吞服，不可以打開或咀嚼膠囊，且其成分對黏膜有刺激性。
VIV01	Viviant f.c. tab 20mg	Bazedoxifene f.c. tab 20mg	芬安膜衣錠20毫克	不宜磨粉；可能致畸胎(teratogenic potential)，應避免皮膚直接接觸。
WON01	Wontran ER tab 75/650mg	Tramadol, ScanoL tab 75/650mg	保寧緩釋錠	緩釋劑型，需整粒吞服，不可咬碎剝半或磨粉。
ZEP01	Zepatier tab 50/100mg	Elbasvir, Grazoprevir 50/100mg	賀肝樂膜衣錠	需整粒吞服，且應保存於原本的泡囊包裝中，待使用時再取出，以避免接觸濕氣。