

達癬治® 注射操作 說明

Taltz® 達癬治®是一種用於治療中度至重度斑塊性乾癬病人的處方藥物，使用的對象包括適合接受全身性治療的患者。

此資料僅提供給已處方此藥的病人。

如何保存以及使用 Taltz 達癬治

使用 Taltz 達癬治自動注射筆前，請詳閱使用說明或聯絡您的醫療人員。

TALTZ 達癬治劑量時間表¹



如何保存 TALTZ 達癬治: 冷藏保存，勿冷凍

- 請將針劑放在原包裝內冷藏至欲使用之時間。¹
- 請避開日曬及避免光線直射，並且不可置放於 30° C 以上的環境。²



請勿冷凍。
若 Taltz 達癬治已結凍，
請勿使用。¹



請將 Taltz 達癬治存放於
原始包裝，以避免
光線直射。¹



請勿搖晃 Taltz 達癬治。¹

自動注射筆的各部分


即使您曾使用過其它類型的生物製劑，請注意 Taltz 達癩治自動注射筆的構造及使用方法可能有所不同。為了讓您順利使用 Taltz 達癩治，請詳閱以下說明，瞭解構造及步驟，以便正確地完成注射程序。



注射筆操作步驟


1. 事前準備²

- 自冰箱取出 Taltz 達癬治自動注射筆。
- 檢視有效日期，並檢查注射筆是否損壞。
- 讓注射筆在**室溫下放置30分鐘**，保持基蓋座鈕上的狀態。
- 注射前請清洗雙手。




2. 選擇您的注射部位²

- 您可注射於腹部區域、大腿或手臂背面。如欲注射於手臂背面，將需要他人協助您。
- 請勿注射於皮膚患有乾癬斑塊的區域。
- 應輪流使用不同的注射位置。您可以選擇相同的身體部位注射，但應避免每次注射於完全相同的位置。



3. 開始注射²

- 確認上鎖環在上鎖位置。
- 依照箭頭方向轉下基座蓋。
- 取下蓋子時有微量液體滲漏是正常現象，這不影響其劑量。
- 將透明基座平放，並且壓住注射部位的皮膚。將上鎖環旋轉至解鎖。
- 注射筆固定好後，壓下綠色注射鈕。將會發出響亮的喀聲——表示藥物開始注射。
- 您將在第一聲之後約10秒聽到第二次喀聲。第二次喀聲表示您已完成注射。



4. 結束注射²

- 將使用過的 Taltz 達癩治自動注射筆在使用後立即放入尖銳物品收集筒。請勿將 Taltz 達癩治自動注射筆丟棄(丟掉)於居家廢棄物中。
- 若您沒有適當的之尖銳物品收集筒，也可使用符合以下條件之家用容器：
 - 由強化塑膠製成，
 - 可由緊密且防穿刺之蓋子關閉，使尖銳物品無法掉出，
 - 使用時可直立且穩固放置，
 - 防滲漏，而且
 - 具有適當標示，警告容器內含有危險廢棄物。
- 當尖銳物品收集筒接近裝滿時，將需要遵照您的當地法規以及社區規定以適當方式丟棄尖銳物品保存容器。
- **請勿**回收使用過的尖銳物品收集筒。

注射部位之不良反應

使用 Taltz 達癬治自動注射筆時，若出現以下任何注射部位之皮膚疼痛以及紅腫等不良反應^{1,3}，請聯絡您的醫療人員。

- 大多數注射部位之不良反應會在治療開始後2週內發生，並且不會持續太長的時間。⁴
- 注射當下可能發生注射部位的疼痛，數天後可能出現紅腫等情形。
- 大部分注射部位的不良反應，不會導致乾癬患者停止使用 Taltz 達癬治做治療。¹
- 我們的臨床實驗中，大部病人所發生的注射部位之不良反應只有輕度到中度⁴。若症狀造成您的不適，請向醫師說明。



注射小訣竅

生物製劑注射小訣竅 *

- 請與您的醫師討論：
 - 注射前後在注射部位上使用冰敷可能有助於減少疼痛⁵
 - Acetaminophen 可能有助於減少疼痛⁶
 - 使用抗組織胺或類固醇藥膏可能可減少皮膚出現的搔癢或紅腫現象⁶
- 請於每一次的注射時輪流選擇不同部位²

使用 TALTZ 達癬治自動注射筆小訣竅

- 使用前應將 Taltz 達癬治自動注射筆從冰箱取出，在室溫放置30分鐘使其回到室溫。請勿將自動注射筆微波，浸泡在熱水或讓陽光直射。¹

*以上訣竅並沒有經過 Taltz 達癬治臨床研究證明其效用。

taltz® (ixekizumab)

達癬治® 注射劑 TALTZ® (ixekizumab) injection

適應症: 治療適合接受全身性治療的中至重度斑塊性乾癬之成人患者。

使用方法: 應以皮下注射方式給予。建議劑量為第0週給予160 mg, 接著於第2、4、6、8、10與12週投予80 mg, 之後每4週投予80 mg。治療前應評估病患是否感染結核病。

使用禁忌: 不得使用於曾對於ixekizumab或任何賦形劑發生嚴重過敏反應(如全身性過敏性反應)的病患。

注意事項: 在開始治療前應進行結核病、B型肝炎、C型肝炎感染之評估。若病患發生嚴重感染或對於標準治療反應不佳, 應密切監測病患, 並停用藥物直到感染解除。應在治療期間監測發炎性腸道疾病的發生或惡化。若發生嚴重過敏反應, 應立即停用藥物, 並展開適當治療。接受治療的病患應避免使用活性疫苗。

常見的不良反應(≥1%): 注射部位反應、上呼吸道感染、噁心、癬感染。

詳細資料、不良反應、警語與注意事項等請參照TALTZ®藥品說明書。

本藥須由醫師處方使用 衛部菌疫輸字第001063號

REFERENCES

1. Taltz藥品仿單。衛部菌疫輸字第001063號
2. Taltz使用說明。
3. Data on file [Summary of Clinical Safety Ixekizumab (LY2439821) Plaque Psoriasis Indication]. Eli Lilly and Company.
4. Reich K, Leonardi C, Ohtsuki M. Safety and tolerability of ixekizumab: integrated analysis of injection-site reactions in patients with moderate-to-severe psoriasis treated with ixekizumab compared with placebo or etanercept from three phase 3 trials. Poster presented at: 25th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress. 28 September-2 October, 2016; Vienna, Austria.
5. Kuzu N, Ucar H. The effect of cold on the occurrence of bruising, haematoma and pain at the injection site in subcutaneous low molecular weight heparin. *Int J Nurs Stud.* 2001;38(1):51-59.
6. Sandoval LF, Feldman SR. Biologics in practice: managing common side effects. *The Dermatologist.* 2013;21(5):1. <http://www.the-dermatologist.com/content/biologics-practice-managing-common-side-effects>.



台灣禮來股份有限公司
台北市復興北路365號11樓
TEL:(02)27152950