




編 號	50	名 稱	核醫錄-67發炎、不明熱或腫瘤掃描 (Ga-67 Scan for Inflammation)、(Ga-67 Scan for Unknown Fever)、(Ga-67 Scan for Tumor Survey)	修訂日期	2021/09/02
				修訂版次	第11版

主要目的	<p>一、偵測發炎感染之病灶位置。</p> <p>二、尋找不明熱的原因。</p> <p>三、偵測及追蹤惡性淋巴瘤、黑色素瘤、軟組織肉瘤、肺癌、白血病等腫瘤。</p>
------	--

檢查流程	<ol style="list-style-type: none"> 核醫科櫃檯報到後，請至休息區稍候，輪到您時，會有人呼叫您的名字。 先至注射室接受靜脈注射核醫藥物：鎂-67。 注射核醫藥物後，再由醫師約定造影的時間（通常是注射日算第一日，第三日回來造影），但部分疑似炎症病患可能提前造影（第二日）或增加造影的次數（即除第三日外，再加照第四日或第五日）。 依約定時間至休息區等候照相，輪到您時，技術師會呼叫您的名字，並通知您先解小便。 依指示平躺於檢查床，進行從頭至腳全身造影，需時約30分。 若有需要，會進行單光子斷層掃描(360度掃描)，時間約30分鐘。
------	--



注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。 使用鐵劑之病人，需間隔一週以上再進行鎂-67檢查。 使用Gadolinium(Gd)進行核磁共振(MRI)檢查之病人需間隔24小時以上再進行鎂-67檢查。 鎂-67可經由乳腺分泌，哺乳婦女若接受檢查須停止哺乳至少2週。 化學治療將減低腫瘤組織對鎂-67之攝取量，最好於治療後3週以上再進行檢查 本項檢查前並不需特別的準備，不需禁食。藥物會經由腸胃道代謝，檢查期間可以多食用青菜水果等食物幫助腸胃道蠕動。 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：項鍊)。 建議於注射後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 本項檢查罕見有過敏等副作用。 本項檢查所用藥物雖具放射性，但非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，給藥後三日內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。
------	--

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email：nm@vghtc.gov.tw