



編號	21	名稱	核醫腹水溢漏之掃描 (Scan of Intractable Ascites)		修訂日期	2025/01/01
					修訂版次	第11版

主要目的	偵測腹水是否溢漏至他處，最常見之溢漏部位為胸腔和下陰部。
------	------------------------------

檢查流程	1. 核醫科櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至第4造影室插卡報到，再至休息區等候。 2. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，再至核醫造影室。 3. 檢查時，我們會從腹壁執行腹膜腔穿刺，再經由穿刺針注射少量的核醫藥物(Tc-99m phytate)至腹膜腔內。隨後每間隔10-60分鐘進行一系列造影，直至確定溢漏部位或醫師決定檢查結束為止，因此造影時間將因個人情況而有差異。 4. 若為洗腎病患已有經皮腹腔管路，則不必執行腹膜腔穿刺。可直接將核醫藥物注射至透析液中，再將透析液注入腹腔，先不要放出，待檢查完畢再將透析液放出。 5. 造影檢查時，只需靜靜站著或躺著，並不會痛苦。
--------------------	--



注意事項	1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。 2. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：金屬扣皮帶)。 3. 本檢查無須禁食。 4. 建議於檢查期間盡量不要飲食，以免影響檢查結果。檢查結束後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 5. 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。 6. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 7. 本項檢查罕見有過敏等副作用。 8. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。
------	---

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email : nm@vghtc.gov.tw