

臺中榮總不宜磨粉藥品清單

2023/06 更新

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
LAG01	(CDC) Molnupiravir cap 200mg	Molnupiravir cap 200mg			抗病毒藥物，需整粒吞服，切勿打開、破壞或壓碎膠囊。無法口服且有用藥需求之病患，可以考慮打開膠囊以口服懸浮液配置(oral suspension)方式給予病患，但須注意此做法之效用並未在臨床試驗中評估。
TPO01	(CDC) Tpoxx cap 200mg	Tecovirimat cap 200mg-CDC		膠囊	若無法吞嚥膠囊，可將單次劑量膠囊小心地打開，將所有內容物與 30mL液體（例如：牛奶、巧克力牛奶）或軟質食物（例如：蘋果醬、優格）混合，並應於混合後 30分鐘內服用完所有混合物。
OPS02	(CM)Opsumit tab 10 mg	Macitentan tab 10mg	奧欣明膜衣錠10毫克	膜衣錠	應以開水整粒吞服；不可以剝半、弄碎或嚼碎。
KIS01	(FREE) Kisqali tab 200mg	FREE-Ribociclib tab 200mg	擊癌利200毫克	膜衣錠	藥錠應整顆吞服(吞服前不可咀嚼、壓碎或剝開藥錠)。藥錠若裂開、破碎或不完整，請勿服用。
LOR04	(Free) Lorviqua tab 25mg	Free-Lorlatinib tab 25mg	瘤利剎膜衣錠25毫克	膜衣錠	必須以至少240mL的水完全吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎或剝半。
NER02	(Free) Nerlynx tab 40mg	Neratinib tab 40mg-Free	賀儂安膜衣錠40毫克	膜衣錠	需整粒吞服，不可以剝半、咬碎、咀嚼
NUB01	(Free) Nubeqa F.C tab 300mg	Darolutamide F.C tab 300mg	諾博戈膜衣錠300毫克	膜衣錠	應整顆吞服，不可咀嚼、咬碎或剝開
RIN06	(Free) Rinvoq ER tab 15mg	Upadacitinib ER tab 15mg	銳虎持續性藥效錠15毫克	持續性藥效錠	需整粒吞服，不可研磨、剝半、咀嚼
CAP08	(Free) Tabrecta tab 200mg	Capmatinib tab 200mg-Free	泰芮塔200毫克膜衣錠	膜衣錠	需整顆吞服，請勿剝半、研磨或咀嚼
VER02	(Free) Verzenio tab 150mg	(Free) Abemaciclib tab 150mg	捷嘉寧膜衣錠150毫克-Free	膜衣錠	應整顆吞服，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服
ZYT02	(Free) Zytiga tab 250mg	ABIRATERONE ACETATE TAB 250MG	澤珂錠250毫克	錠劑	必須整顆以水吞服，請勿壓碎或嚼碎。
TAM03	(LOTUS)100mg TamOS cap	Temozolomide cap 100mg	特莫斯膠囊100毫克	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
TAM02	(LOTUS)20mg TamOS cap	Temozolomide cap 20mg	特莫斯膠囊20毫克	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
MIN03	(MELT)Minirin tab 60mcg	DESMOPRESSIN MELT 60mcg	迷你寧凍晶口溶錠60mcg	口溶錠	不建議磨粉，因此藥為凍晶舌下口溶錠，置於舌下即可吸收
XEL02	(XR) 11mg Xeljanz tab	Tofacitinib XR tab 11mg	捷抑炎持續性藥效錠11毫克	持續性藥效錠	需整粒吞服不可壓碎、剝半或咀嚼
TOP03	(十全)Topaless F.C. tab 100mg	Topiramate tab 100mg	顛除膜衣錠100毫克	膜衣錠	1. Topiramate有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物/食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。
AV510	(□) 30mg Vinorelbine cap	VINORELBINE SOFT CAP 30MG	溫諾平 30 毫克軟膠	軟膠囊	口服抗癌藥；需以冷開水整顆吞服，不可磨粉、嚼食或剝開。
CRE02	(□) Cresemba cap 100mg	Isavuconazole cap 100mg	驅黴霸膠囊100毫克	膠囊	須整顆膠囊吞服。勿嚼碎、擠壓、溶解或打開膠囊。可伴隨食物或空腹服用。
TAI01	(□) Taigexyn cap 250mg	Nemonoxacin cap 250mg	太捷信膠囊250毫克	膠囊	有特殊的味道，建議整粒吞服（仿單）
AV500	(□)20mg Vinorelbine cap	VINORELBINE SOFT CAP 20MG	溫諾平軟膠囊—20	軟膠囊	口服抗癌藥；需以冷開水整顆吞服，不可磨粉、嚼食或剝開。
KRE01	(□)Kremezin tab 500mg*4/pkg	Spherical absorptive carbon	克裏美淨速崩錠500毫克	速崩錠	在高溫下氧化還原球型活性碳而得到之球狀具吸附力之碳，需直接服用，不可以再磨粉
AL680	(□)Takepron OD tab 30mg	LANSOPRAZOLE OD TAB 30MG	泰克胃通口溶錠30	腸溶性細粒之口溶錠	將本藥置於舌頭上，可立即溶解，勿咀嚼，直接吞服，或配適量溫開水吞服。可剝半但不可磨。經由鼻胃管給藥時，將藥錠放入針筒中，抽取約10 ml的水；輕搖以使快速崩解；藥錠崩散後，請於15分鐘內經由鼻胃管給藥；針筒重新抽取約5 ml的水，輕搖後用以沖洗鼻胃管。
UNA01	(□)Unasyn tab 375mg	SULTAMICILLIN TOSYLATE TAB 375MG	優耐迅口服錠劑	膜衣錠	錠劑需整顆吞服，不可咀嚼。如有需要可將錠劑分開成兩半以利吞服，但不可咀嚼。因若磨粉容易吸潮，加上clavulanic acid對潮濕敏感，藥效降解速度快，故不建議磨粉及泡水分次使用。
TAR05	(國衛) 100mg Tarceva tab	(國衛) Erlotinib tab 100mg	得舒緩膜衣錠100毫克	膜衣錠	口服抗癌藥；可將藥錠放入100 ml的飲用水中，攪拌直到藥錠溶解後立即喝下；或經由鼻胃管管灌
TAR06	(國衛) 150mg Tarceva tab	(國衛) Erlotinib tab 150mg	得舒緩膜衣錠150毫克	膜衣錠	口服抗癌藥；可將藥錠放入100 ml的飲用水中，攪拌直到藥錠溶解後立即喝下；或經由鼻胃管管灌
ALE05	(國衛) Alecensa cap 150mg	(國衛) Alectinib cap 150mg	安立適膠囊150毫克	膠囊	需整粒吞服，切勿打開膠囊或將膠囊內容物溶化使用
ROZ03	(國衛) Rozlytrek cap 200mg	(國衛) Entrectinib cap 200mg	羅思克200毫克膠囊	膠囊	應整顆吞服。不可打開、壓碎、咀嚼或溶解內容物
ZEL03	(國衛) Zelboraf tab 240mg	(國衛) Vemurafenib tab 240mg	日沛樂膜衣錠240毫克	膜衣錠	化療藥品，需整粒吞服，不可以剝半、咬碎、咀嚼
TEP03	(國衛) Tepmetko tab 225mg	(國衛) Tepotinib tab 225mg	德邁特膜衣錠225毫克	膜衣錠	需整顆吞服，請勿剝半、研磨或咀嚼
ALP03	(專案) 200mg Alpelisib tab	Alpelisib tab 200mg		錠劑	需整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼
ONU01	(專案) 200mg Onureg tab	Azacitidine tab 200mg-專案		錠劑	口服抗癌藥，應整粒吞服，不可壓碎或切割
ONU02	(專案) 300mg Onureg tab	Azacitidine tab 300mg-專案		錠劑	口服抗癌藥，應整粒吞服，不可壓碎或切割
ALP02	(專案) 50mg Alpelisib tab	Alpelisib tab 50mg		錠劑	需整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼
ALM01	(專案) Almonertinib tab 55mg	Almonertinib tab 55mg-專案	阿美樂	膜衣錠	化學治療藥，需整粒吞服

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
BRA01	(專案) Braftovi cap 75mg	Encorafenib cap 75mg	博癌癥75毫克膠囊	膠囊	抗腫瘤藥物，須整粒吞服
ROZ05	(專案) Rozlytrek cap 200mg	Entrectinib cap 200mg		膠囊	應整顆吞服。不可打開、壓碎、咀嚼或溶解內容物
SEL04	(專案) Selumetinib cap 10mg	Selumetinib cap 10mg-專案		膠囊	需整粒吞服，不可咀嚼、溶解或打開膠囊
BS370	(專案)Diacomit cap 250mg	STIRIPENTOL CAP 250MG	戴克癩 膠囊250毫克	膠囊	必須整顆吞服，不可打開膠囊或壓碎
ENT06	(專案)Entrectinib cap 200mg	Entrectinib cap 200mg		膠囊	屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套）。膠囊應以水整粒吞服，勿嚼碎、弄破、打開或融化
SEL03	(專案)Selpercatinib cap 80mg	Selpercatinib(LY3527723) 80mg		硬膠囊	化學治療藥，需整粒吞服
TAK02	(專案)TAK-788(Mobocertinib) 40mg	Mobocertinib 40mg		膠囊	化療藥品，需整粒吞服，不可以剝半、咬碎、咀嚼
TEP01	(專案)Tepmetko tab 225mg	Tepotinib HCl hydrate 225mg	德邁特膜衣錠225毫克	膜衣錠	需整顆吞服，請勿剝半、研磨或咀嚼
AC210	(錠)Ciproxin tab 250mg	Ciprofloxacin tab 250mg	速博新膜衣錠	膜衣錠	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半。
AC910	(錠)Klaricid tab 500mg	Clarithromycin tab 500mg	開羅理黴素膜衣錠	膜衣錠	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半
POS01	(錠)PosanoL tab 100mg	Posaconazole tab 100mg	波賽特錠劑100毫克	錠劑	須整粒吞服，勿剝半、壓碎或咀嚼。
BM460	(顆粒) Pentasa gran. 2G	MESALAZINE PR Granules 2g	頗得斯安顆粒劑 2 g	持續性藥效顆粒劑	直接將顆粒劑倒在舌頭上，用水或果汁吞服，不可咀嚼。
ELT01	0.05mg Eltroxin tab	Levothyroxine tab 0.05mg	昂特欣錠 50 微克	錠劑	必須整顆吞服，不可剝半，而且必須空腹服用(飯前30分至1小時)。若嘗試將錠劑剝半很容易弄碎，且可能產生服用劑量不一致的風險
MIR02	0.375mg Mirapex PR tab	Pramipexole PR tab 0.375mg	樂伯克持續性藥效錠 0.375毫克	持續釋放錠	持續性藥效錠必須整顆吞服，不可嚼碎、壓碎或切割。
ADV10	0.5mg Advagraf cap	TACROLIMUS PR CAP 0.5MG	安瑞福0.5毫克持續性	持續性藥效膠囊	持續性藥效膠囊，需整粒吞服
AE670	0.5mg Certican tab	EVEROLIMUS TAB 0.5MG	卓定康錠 0.5 毫克	錠劑	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有30mL水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以30mL水潤洗容器後服下。
RAP01	0.5mg SIROLimus tab	Sirolimus tab 0.5mg	斥消靈錠0.5毫克	糖衣錠	它是一種利用NanoCrystal technology做成的特殊劑型，必須整粒吞服，不可以嚼碎、弄破或搗碎。
MIR10	1.5mg Mirapex PR tab	Pramipexole PR tab 1.5mg	樂伯克持續錠1.5毫克	持續釋放錠	持續性藥效錠必須整顆吞服，不可嚼碎、壓碎或切割。
BS060	100/25/200 Stalevo	LEVODOPA/CARBIDOPA/ ENTACAPONE	始立膜衣錠	複方膜衣錠	複方製劑，不宜磨粉。
DIC03	100mg Dicetel tab	100mg Pinaverium tab	得舒特膜衣錠100毫克	膜衣錠	整粒吞服，請勿口含或咀嚼。請於用餐時以一大杯開水吞服以避免食道粘膜接觸。躺臥時或就寢前請勿服用。
IBR02	100mg Ibrance cap	Palbociclib cap 100mg	愛乳適膠囊100毫克	膠囊	膠囊應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎或打開膠囊。如果膠囊破損、有裂痕或殘缺不完整，請不要服用。
BS030	100mg Sandimmun cap	100MG CICLOSPORIN CAP	新體睦軟膠囊	軟膠囊	內含油狀物，應整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼
AE530	100mg Tarceva tab	Erlotinib tab 100mg	得舒緩膜衣錠 100 毫克	膜衣錠	口服抗癌藥；可將藥錠放入100 ml 的飲用開水中，攪拌直到藥錠溶解後立即喝下；或經由鼻胃管管灌。
AT220	100mg Temodal cap	Temozolomide cap 100mg	帝盟多膠囊	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
AT420	100mg Tramadol SR tab	Tramadol SR tab 100mg	妙而通持續釋放錠	持續釋放錠	磨粉後破壞控制釋放的設計。
TRO08	100mg Trokendi XR cap	Topiramate XR cap 100MG	妥偏停持續性釋放膠囊100毫克	持續性釋放膠囊	1. Topiramate有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物/食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。
VEN05	100mg Venclexta tab	Venetoclax tab 100mg	唯可來膜衣錠 100 毫克	膜衣錠	應整顆吞服，不可咀嚼、咬碎或剝開
LEN05	10mg Lenvima cap	10mg Lenvatinib cap	樂衛瑪膠囊10毫克	膠囊	可整粒吞服，或將膠囊先溶解於小杯液體後服用。將膠囊放入一大湯匙的水或蘋果汁中(膠囊不需打開或壓碎)，以溶解於液體。將膠囊靜置於水或蘋果汁中至少10分鐘，再攪拌至少3分鐘。飲用混合液後，再加入一大湯匙的水或蘋果汁於玻璃杯中，攪勻後再飲用開水或蘋果汁。
OXY02	10mg OxyContin CR tab	Oxycodone CR tab 10mg	疼始康定10毫克持續藥效錠	持續釋放錠	持續藥效錠，應整粒吞服，並配以足量的開水，不可切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解
REV01	10mg Revlimid cap	Lenalidomide cap 10mg	瑞復美膠囊10毫克	膠囊	化療藥品，必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊
VEN03	10mg Venclexta tab	Venetoclax tab 10mg	唯可來膜衣錠 10 毫克	膜衣錠	應整顆吞服，不可咀嚼、咬碎或剝開
VOL01	10mg Volibris tab	AMBrisentan tab 10mg	肺博舒10毫克	膜衣錠	錠劑不可剝開、研碎或嚼碎
PRA10	110mg Pradaxa cap	DABIGATRAN ETEXILATE CAP 110MG	普栓達膠囊110毫克	膠囊	膠囊必需整顆吞服，不可咀嚼、撥開或壓碎；因可能導致藥物暴露量增加，使得出血風險增加。
BB140	125mg Bosentan tab-1st	Bosentan tab 125mg-1st	全可利125毫克	錠劑	需整粒吞服。若無法吞服，於給藥前立即將其分散在最少量的水中立即服用。有可能致畸胎，懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的Bosentan錠劑。
TRA05	125mg Bosentan tab-2nd	Bosentan tab 125mg-2nd	愛可泰隆全可利125毫克	錠劑	需整粒吞服。若無法吞服，於給藥前立即將其分散在最少量的水中立即服用。有可能致畸胎，懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的Bosentan錠劑。
IBR01	125mg Ibrance cap	Palbociclib cap 125mg	愛乳適膠囊125毫克	膠囊	膠囊應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎或打開膠囊。如果膠囊破損、有裂痕或殘缺不完整，請不要服用。
RYB04	14mg Rybelsus tab	Semaglutide tab 14mg	瑞倍適錠14毫克	錠劑	整顆吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研讀建議(藥品手冊)
PRA20	150mg Pradaxa cap	DABIGATRAN ETEXILATE CAP 150MG	普栓達膠囊150毫克	膠囊	膠囊必需整顆吞服，不可咀嚼、撥開或壓碎；因可能導致藥物暴露量增加，使得出血風險增加。
AE540	150mg Tarceva tab	Erlotinib tab 150mg	得舒緩膜衣錠150毫克	膜衣錠	口服抗癌藥；可將藥錠放入100 ml的飲用水中，攪拌直到藥錠溶解後立即喝下；或經由鼻胃管灌。
JAK03	15mg Jakavi tab	Ruxolitinib tab 15mg	捷可衛錠15毫克	錠劑	必須整顆吞服，不可切開、敲碎或咀嚼。從NG tube 灌藥時，一顆加入40mL水中，攪拌10分鐘後給藥，再以75mL水沖洗NG tube；藥錠崩散於水後應在6小時內服用完畢。
LON03	15mg Lonsurf tab	Trifluridine/Tipiracil 15mg	朗斯弗膜衣錠15毫克	膜衣錠	膜衣錠應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎。管灌：投入適量的溫水中(22~55°C)，約15分鐘後，即可調配成懸浮溶液。藥品配置後，可放在室溫穩定6小時。
LIP07	160mg Lipanthy tab	Fenofibrate 160mg tablet	弗尼利脂寧160公絲膜衣錠	膜衣錠	是由膜衣包裹的錠劑，含有160mg微粒化的fenofibrate；不建議磨粉
ALU06	180mg Alunbrig film-coated tab	Brigatinib film-coated tab 180mg	癌能畢膜衣錠180毫克	膜衣錠	應整顆吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
BM020	18mg Concerta ER tab	Methylphenidate ER tab 18mg	專思達長效錠18毫克	持續釋放錠	應整顆吞服，不可剝半或嚼碎
ADE06	1mg Adempas tab	Riociguat tab 1mg	愛定保肺膜衣錠1毫克	膜衣錠	建議整顆吞服，對於無法整顆吞服的病患，可以在服用前壓碎錠劑且立即與水或軟食物，例如蘋果醬混合，口服服用
BT460	1mg Advagraf cap	TACROLIMUS 1MG PR CAP	安瑞福1毫克持續膠囊	持續性藥效膠囊	持續性藥效膠囊，需整顆吞服
INL10	1mg Inlyta tab	Axitinib tab 1mg	抑癌特膜衣錠1毫克	膜衣錠	口服抗癌藥，不可磨粉、不可剝半使用。應以一杯水整顆吞服。
ADE08	2.5mg Adempas tab	Riociguat tab 2.5mg	愛定保肺膜衣錠2.5毫克	膜衣錠	建議整顆吞服，對於無法整顆吞服的病患，可以在服用前壓碎錠劑且立即與水或軟食物，例如蘋果醬混合，口服服用
DES03	2/0.5mg Desud plus tab	Buprenorphine 2mg, Naloxone 0.5mg	解佳益2/0.5毫克舌下錠	舌下錠	舌下錠需置於舌下直到溶化，不可咀嚼或直接吞服，否則會影響其藥效
DEP04	200mg Depakine tab	Valproate Sod. tab 200mg	帝拔類腸溶錠	腸溶錠	藥品易吸潮，且對粘膜有刺激性；腸溶錠宜整顆吞服，不可剝半服用。
TRO04	200mg Trokendi XR cap	TOPIRAMATE XR cap 200MG	妥偏特持續性釋放膠囊200毫克	持續釋放膠囊	1. Topiramate有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物/食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。
AN680	200-Nilotinib cap	NILOTINIB HCL CAP 200 MG	泰息安膠囊200毫克	膠囊	整顆吞服，勿將膠囊打開或咬碎。破壞膠囊可能會使血中濃度增加、增加毒性。(ISMP)
CAB06	20mg Cabometyx tab	Cabozantinib tab 20mg	癌必定膜衣錠20毫克	膜衣錠	口服抗癌藥，必須整顆錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。
LON04	20mg Lonsurf tab	Trifluridine/Tipiracil 20mg	朗斯弗膜衣錠20毫克	膜衣錠	膜衣錠應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎。管灌：投入適量的溫水中(22~55°C)，約15分鐘後，即可調配成懸浮溶液。藥品配置後，可放在室溫穩定6小時。
OXY03	20mg OxyContin CR tab	Oxycodone CR tab 20mg	疼始康定20毫克持續藥效錠	持續釋放錠	持續藥效錠，應整顆吞服，並配以足量的開水，不可切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解
RIT01	20mg Ritalin LA cap	Methylphenidate LA cap 20mg	利長能持續性藥效膠囊20毫克	持續性藥效膠囊	持續性藥效膠囊須整顆吞服，膠囊內的藥粒不可磨碎、咀嚼或切割藥粒。可將膠囊內的藥粒撒在少量的食物上服用；將藥粒撒在蘋果泥，蘋果泥不可加熱，因為溫度會破壞藥品緩慢釋出的特性。藥粒和蘋果泥混合後，應立刻全部吃完，不可將這混合物儲存以備將來服用。
AT070	20mg Temodal cap	Temozolomide cap 20mg	帝盟多膠囊	膠囊	為口服抗癌藥，應整顆吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
TS110	20mg TS-1 cap	TEGAFUR,GIMERACIL,OT ERACIL 20MG	愛斯萬膠囊20毫克	膠囊	口服抗癌藥，應整顆吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
BC730	250mg Crizotinib cap	Crizotinib cap 250mg	截剋瘤膠囊250毫克	膠囊	膠囊需整顆吞服，不可磨粉、溶解或打開膠囊。
REV10	25mg Revlimid cap	Lenalidomide cap 25mg	25毫克瑞復美膠囊	膠囊	化療藥品，必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊
BS040	25mg Sandimmun cap	25MG CICLOSPORIN CAP	新體睦軟膠囊	軟膠囊	內含油狀物，應整顆吞服，不宜磨粉或咀嚼
TS120	25mg TS-1 cap	TEGAFUR,GIMERACIL,OT ERACIL 25MG	愛斯萬膠囊25毫克	膠囊	口服抗癌藥，應整顆吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
CON02	27mg Concerta ER tab	Methylphenidate ER tab 27mg	專思達長效錠27毫克	持續釋放錠	應整顆吞服，不可剝半或嚼碎
POM01	2mg Pomalyst cap	Pomalidomide cap	鉑美特膠囊2毫克	膠囊	膠囊必須整顆吞服，請勿壓碎、咀嚼或打開膠囊
BS250	2mg/0.5 Suboxone tab	Buprenorphine 2mg, Naloxone 0.5mg	舒倍生2毫克	舌下錠	舌下錠需置於舌下直到溶化，不可咀嚼或直接吞服，否則會影響其藥效
GIO01	30mg Afatinib tab	Afatinib dimaleate tab 30mg	妥復克膜衣錠30毫克	膜衣錠	藥粒需整顆吞服，無法吞服藥粒的病人，可將藥錠放入100毫升飲用水中攪拌溶解後立即使用，再以100毫升飲用水潤洗殘留在杯中藥物並服下。以此方式可經由鼻胃管給藥。
ALU05	30mg Alunbrig film-coated tab	Brigatinib film-coated tab 30mg	癌能畢膜衣錠30毫克	膜衣錠	應整顆吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
FM040	30mg Morphine tab	MORPHINE CONT. TAB 30MG	嗎啡長效膜衣錠	持續釋放錠	磨粉後破壞控制釋放的設計。
VIZ02	30mg Vizimpro F.C tab	Dacomitinib tab 30mg	肺欣妥膜衣錠30毫克	膜衣錠	化療藥品，需整顆吞服，不可以剝半、咬碎、咀嚼
MET19	33mg Methydur SR cap	Methylphenidate SR cap 33mg	思有得持續性藥效膠囊33毫克	持續性藥效膠囊	必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊
BM030	36mg Concerta ER tab	Methylphenidate ER tab 36mg	專思達長效錠36毫克	持續釋放錠	應整顆吞服，不可剝半或嚼碎
AR370	3mg Rivastigmine	RIVASTIGMINE HYDROGEN TARTR.3MG	憶思能膠囊	膠囊	需整顆吞服。若無法整顆吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
RYB02	3mg Rybelsus tab	Semaglutide tab 3mg	瑞倍適錠3毫克	錠劑	整顆吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼
GIO02	40mg Afatinib tab	Afatinib dimaleate tab 40mg	妥復克膜衣錠40毫克	膜衣錠	藥粒需整顆吞服，無法吞服藥粒的病人，可將藥錠放入100毫升飲用水中攪拌溶解後立即使用，再以100毫升飲用水潤洗殘留在杯中藥物並服下。以此方式可經由鼻胃管給藥。
CAB05	40mg Cabometyx tab	Cabozantinib tab 40mg	癌必定膜衣錠40毫克	膜衣錠	口服抗癌藥，必須整顆錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。
RET01	40mg Retsevmo cap	Selpercatinib cap 40mg	銳癌寧膠囊40毫克	膠囊	化學治療藥，需整顆吞服

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
BA720	40mg Strattera cap	ATOMOXETINE CAP 40MG	思銳膠囊 40 毫克	膠囊	藥品具有刺激性，建議整粒吞服。
MET20	44mg Methydrur SR cap	Methylphenidate SR cap 44mg	思有得持續性藥效膠囊44毫克	持續性藥效膠囊	必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊
VIZ01	45mg Vizimpro F.C tab	Dacomitinib tab 45mg	肺欣妥膜衣錠45毫克	膜衣錠	化療藥品，需整粒吞服，不可以剝半、咬碎、咀嚼
BD050	4mg Doxaben XL tab	DOXAZOSIN XL TAB 4MG	可迅持續藥效錠	持續釋放錠	需整粒吞服，不可咬碎，分割或磨碎。
LEN02	4mg Lenvima cap	Lenvatinib cap 4mg	樂衛瑪膠囊4毫克	膠囊	可整粒吞服，或將膠囊先溶解於小杯液體後服用。將膠囊放入一大湯匙的水或蘋果汁中(膠囊不需打開或壓碎)，以溶解於液體。將膠囊靜置於水或蘋果汁中至少10分鐘，再攪拌至少3分鐘。飲用混合液後，再加入一大湯匙的水或蘋果汁於玻璃杯中，攪勻後再飲用完水或蘋果汁。
POM02	4mg Pomalyst cap	Pomalidomide cap 4mg	鉑美特膠囊4毫克	膠囊	膠囊必須整粒吞服，請勿壓碎、咀嚼或打開膠囊
AR610	4mg Requip PD tab	ROPINIROLE PD TAB 4MG	力必平持續性膜衣錠	持續性藥效膜衣錠	為持續性藥效膜衣錠，必須整顆吞服；切勿咀嚼、壓碎或剝半使用
AD030	500mg Chrono Depakine tab	SOD. VALPROATE TAB 500mg	帝拔賴持續膜衣錠	長效劑型	磨粉後破壞控制釋放的設計，造成血中濃度不穩定；可剝半服用。
BET04	50mg Betmiga tab	Mirabegron PR tab 50mg	貝坦利持續性藥效錠50毫克	持續性藥效錠	可隨餐或空腹服用，應以水整粒吞服，不可嚼碎、切割或壓碎。
TRO05	50mg Trokendi XR cap	Topiramate XR cap 50mg	妥偏停持續性釋放膠囊50毫克		1. Topiramate 有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate 分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物/食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。
VEN04	50mg Venclexta tab	Venetoclax tab 50mg	唯可來膜衣錠 50毫克	膜衣錠	應整顆吞服，不可咀嚼、咬碎或剝開
BT470	5mg Advagraf cap	TACROLIMUS 5MG PR CAP	安瑞福 5 毫克持續膠囊	持續性藥效膠囊	持續性藥效膠囊，需整粒吞服
INL01	5mg Inlyta tab	Axitinib tab 5mg	抑癌特膜衣錠5毫克	膜衣錠	口服抗癌藥，不可磨粉、不可剝半使用。應以一杯水整顆吞服。
JAK02	5mg Jakavi tab	Ruxolitinib tab 5mg	捷可衛錠5毫克	錠劑	必須整顆吞服，不可切開、敲碎或咀嚼。從NG tube 管灌時，一顆加入40mL水中，攪拌10分鐘後給藥，再以75mL水沖洗NG tube；藥錠崩散於水後應在6小時內服用完畢。
ATA01	5mg Nifedipine cap	NIFEDIPINE CAP 5MG	壓達能軟膠囊 5 公絲	軟膠囊	內為油狀物，不宜磨粉，可咬破後吞服。
CAB04	60mg Cabometyx tab	Cabozantinib tab 60mg	癌必定膜衣錠60毫克	膜衣錠	口服抗癌藥，必須整粒錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。
AG630	60mg Diamicon MR	GLICLAZIDE MR TAB 60MG	岱蜜克龍持續錠 60	持續釋放錠	磨粉後破壞控制釋放的設計。
TRA04	62.5mg Bosentan tab-2nd	Bosentan tab 62.5mg-2nd	愛可泰隆全可利62.5毫克	錠劑	需整粒吞服。若無法吞服，於給藥前立即將其分散在最少量的水中立即服用。有可能致畸胎，懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的Bosentan錠劑。
EXE01	6mg Exelon cap	RIVASTIGMINE HYDROGEN TART.6MG	憶思能膠囊6毫克	膠囊	需整顆吞服。若無法整粒吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
PRA03	75mg Pradaxa cap	DABIGATRAN ETEXILATE CAP 75MG	普栓達膠囊75毫克	膠囊	膠囊必需整顆吞服，不可咀嚼、撥開或壓碎；因可能導致藥物暴露量增加，使得出血風險增加。
RYB03	7mg Rybelsus tab	Semaglutide tab 7mg	瑞倍適錠7毫克	錠劑	整顆吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼
DES02	8/2mg Desud Plus tab	Buprenorphine 8mg, Naloxone 2mg	解佳益舌下錠	舌下錠	舌下錠需置於舌下直到溶化，不可咀嚼或直接吞服，否則會影響其藥效
BM420	800mg Asacol tab	MESALAZINE TAB 800MG	阿腸克錠 800 毫克	腸溶膜衣錠	本錠劑必須整粒吞服，不可嚼碎或折半。
RET02	80mg Retsevmo cap	Selpercatinib cap 80mg	銳癌寧膠囊80毫克	膠囊	化學治療藥，需整粒吞服
REQ30	8mg Requip PD tab	ROPINIROLE PD TAB 8MG	力必平持續錠8毫克	持續性藥效膜衣錠	為持續性藥效膜衣錠，必須整顆吞服；切勿咀嚼、壓碎或剝半使用。
BS260	8mg/2 Suboxone tab	Buprenorphine 8mg, Naloxone 2mg	舒倍生 8 毫克	舌下錠	舌下錠需置於舌下直到溶化，不可咀嚼或直接吞服，否則會影響其藥效
INV01	9mg Invega tab	PALIPERIDONE TAB 9MG	思維佳持續錠9毫克	持續釋放錠	需整粒吞服；不可咬碎、分割或磨碎藥錠。是一種OROS 滲透壓控制釋出的口服劑型
ABI07	Abirarat tab 250mg	Abiraterone acetate tab 250mg	阿比拉那錠250毫克	膜衣錠	應整顆吞服，不可咀嚼、咬碎或剝開
ACA01	Acamprosate calcium tab 333mg	Acamprosate calcium tab 333mg	阿坎酸鈣333毫克緩釋錠	緩釋錠	緩釋錠，須整顆以水吞服，請勿壓碎或嚼碎。
ACA03	Acarizax lyophilisate 12SQ-HDM	Acarizax lyophilisate 12SQ-HDM	阿克立舌下錠12 SQ-HDM	舌下錠	舌下錠，不可磨粉
ACE02	ACEO retard cap 90mg	AceMEtacin retard cap 90mg	痛立安長效膠囊90公絲	長效膠囊	長效膠囊，需整粒以水吞服，不可咬破
AE650	Afinitor tab 5mg	Everolimus tab 5 mg	癌伏妥錠 5 毫克	錠劑	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有30mL水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以30mL水潤洗容器後服下。
AKY01	Akynzeo cap 300mg/0.5mg	Netupitant 300/Palonosetron 0.5	嘔可舒膠囊	膠囊	複方劑型，需整粒吞服
ALE02	Alecensa cap 150mg	Alectinib cap 150mg	安立適膠囊150毫克	膠囊	需整粒吞服，切勿打開膠囊或將膠囊內容物溶化使用
ALF04	Alfacalcidol cap 0.5mcg	Alfacalcidol cap 0.5mcg	愛康鈣軟膠囊0.5微公克	軟膠囊	液體軟膠囊，需整粒吞服
ALG02	Alglutol tab 333mg	Acamprosate calcium tab 333mg	戒酒妥333毫克腸溶錠	腸溶錠	腸溶緩釋錠，須整顆以水吞服，請勿剝半、壓碎或嚼碎
ALV02	Alvotinib F.C tab 400mg	Imatinib F.C tab 400mg	艾亭寧膜衣錠400毫克	膜衣錠	口服抗癌藥，應整粒吞服；無法吞服者可將藥錠放入飲用水或蘋果汁中（100 mg 用50mL，400 mg 用200 mL）攪拌直到藥錠崩解呈懸浮液，立即喝下，再以半杯水沖洗杯緣服下。
AMB01	Ambro SR tab 75mg	AMBROXOL SR TAB 75MG	談舒持續性藥效錠	持續性藥效錠	持續性藥效錠，服用時以充分的開水整粒吞服，不可咀嚼。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研讀建議(藥品手冊)
ASP01	Aspirin tab 100mg	Aspirin tab 100mg-Johnson	阿斯匹林膜衣錠	膜衣錠	磨粉後易潮解(可服用前才磨粉)
ATO03	Atozet tab 10/20mg	Ezetimibe/atorvastatin tab 10/20	優泰脂膜衣錠10/20毫克	膜衣錠	需整粒吞服，不可研碎、溶解或咀嚼使用
XAT01	Atripla@ tab	EFAVIRENZ/TENOFOVIR/EMTRICITABIN	亞翠佩膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服(根據 EACS Guidelines, version 10.1, 2020)
AUB01	Aubagio film coated tab 14 mg	Teriflunomide tab 14 mg	歐博捷膜衣錠14毫克	膜衣錠	味道很苦，不建議剝半或磨粉。
AD990	AVOdart cap 0.5mg	DUTASTERIDE CAP 0.5MG	適尿通軟膠囊	軟膠囊	須整粒吞服；懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸此膠囊，特別是有裂損的膠囊；因此藥可經由皮膚吸收，可能造成胎兒異常。
BAL01	Balversa tab 3mg	Erdafitinib tab 3mg	盼樂膜衣錠3毫克	膜衣錠	需整粒吞服，不可剝半、咬碎或咀嚼
BAL02	Balversa tab 4mg	Erdafitinib tab 4mg	盼樂膜衣錠4毫克	膜衣錠	需整粒吞服，不可剝半、咬碎或咀嚼
BAL03	Balversa tab 5mg	Erdafitinib tab 5mg	盼樂膜衣錠5毫克	膜衣錠	需整粒吞服，不可剝半、咬碎或咀嚼
BIK01	Biktarvy@ tab	Bictegravir/Emtricitabine /TAF	吉他韋 膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，勿咀嚼、壓碎或剝半
AD760	Bisacodyl tab 5mg	BISACODYL TAB 5MG	秘克的腸溶糖衣錠	腸溶錠	磨粉後會破壞腸衣，降低藥效又會造成胃的刺激引起嘔吐。
AB630	Bokey cap 100mg	ACETYL SALICYLIC ACID CAP 100MG	伯基腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊	整粒吞服或打開膠囊但不可咬碎或磨碎顆粒。
BRO01	Broen-C tab	BROMELAIN,L-CYSTEINE ENTERIC TAB	撲炎喜腸溶膜衣錠	腸溶膜衣錠	腸溶膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半、嚼碎、磨粉服用。
AB680	Buprenorphine tab 0.2mg	BUPRENORPHINE SUBGLIN TAB 0.2MG	丁基原啡因舌下錠	舌下錠	舌下錠使用時應置於舌下，不可咀嚼或吞服
AZ130	BuproTRIN SR 150mg QUIT	BUPROPION SR TAB 150MG QUIT	慮舒妥150毫克	持續釋放錠	持續釋放錠，應整粒吞服，不可壓碎或嚼碎。
BM350	C.T.L. XR tab500mg	METFORMIN TAB 500MG	驅糖樂持續錠	持續釋放錠	可剝半，但不可以壓碎或研磨。磨粉後破壞控制釋放的設計
BT210	Cap Topamax-25mg	Topiramate sprinkle cap 25mg	妥泰分散型膠囊25毫克	持續釋放膠囊	1. Topiramate 有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate 分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物/食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。
CAP03	Capecitabine Alvogen tab 500mg	Capecitabine tab 500mg	艾卡培"艾威群"膜衣錠500毫克	膜衣錠	口服抗癌藥，應整粒吞服，不可壓碎或切割
AM950	CellCept cap 250mg	MYCOPHENOLATE MOFETIL CAP 250MG	山喜多膠囊	一般膠囊	需整粒吞服；可能致畸胎，避免直接皮膚接觸。
AE660	Certican tab0.25mg	EVEROLIMUS TAB 0.25MG	卓定康錠 0.25 毫克	錠劑	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有30mL水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以30mL水潤洗容器後服下。
CHO01	Cholbam cap 50mg	Cholic acid cap 50mg	酷立酸膠囊	膠囊	不要壓碎或咀嚼膠囊。不能吞嚥膠囊的病人，可以將膠囊打開並將其內容物混入嬰兒配方奶或擠出的母乳(對於年幼的孩子)、或軟質的食物；如馬鈴薯泥或蘋果泥(對於年齡較大的兒童以及成人)，以便掩蓋任何不愉快的味道。
CIB01	Cibinqo tab 200mg	Abrocitinib tab 200mg	喜績果200毫克膜衣錠	膜衣錠	錠劑應以水整粒吞服，不得切割、壓碎或嚼碎(非整粒吞服尚未臨床試驗)
CIN01	Cinolone film-coated tab 250mg	Ciprofloxacin f.c. tab 250mg	信諾隆膜衣錠250毫克	膜衣錠	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半
BC720	Conslife tab	BISACODYL/SENNOSIDE/DIOCTYL SOD.	秘福糖衣錠	糖衣錠	必須整粒吞服，不得咬碎，且服藥前後一小時不得使用制酸劑或牛乳。
CON09	Const-K ER tab 750mg	Potassium Chloride tab 750mg	康是鉀持續性藥效錠750毫克	持續性藥效錠	持續釋放型藥物需整粒吞服，不可剝半、咬碎或磨粉
CON10	Contrave ER tab 8/90mg	Naltrexone 8/Bupropion 90mg	康纖美持續性釋放錠	持續性釋放錠	持續釋放型藥物需整粒吞服，不可剝半、咬碎或磨粉
COR04	Cortiment MMX PR tab 9mg	Budesonide MMX PR tab 9mg	可帝敏持續性釋放錠9毫克	持續性釋放錠	持續釋放型藥物需整粒吞服，不可剝半、咬碎或磨粉
AL640	Cozaar tab 50mg	LOSARTAN TAB 50MG	可悅您膜衣錠	膜衣錠	宜整粒吞服，可剝半
AZ170	CR Stilnox tab 6.25mg	ZOLPIDEM TARTRATE TAB 6.25MG	使蒂諾斯長效錠	膜衣錠	為一種兩層的加衣長效錠，其中一層會快速釋出藥物成分，另一層則會緩慢釋出藥物成分。不宜磨粉，需整粒吞服，不可折半、壓碎或咀嚼。
CRE03	Creon cap 300mg	Pancreatin cap 300mg	卡利消腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊	1. 膠囊須於餐中或與點心，或在餐後配合足夠的液體整粒吞服，不可磨碎或咀嚼。須注意不要將藥品滯留於口中，應盡速吞下。 2. 吞服膠囊若有困難時(例如小孩或老人)，可小心打開膠囊，將其中的腸溶微粒加入酸性(pH < 5.5)軟質的食物中，例如蘋果泥或優格，或pH小於5.5的果汁例如蘋果汁、柳橙汁或鳳梨汁。腸溶微粒與食物或液體的混合物應立即服用，不可再儲存。
CUR04	Curam Film-coated tab 1000mg	Amoxil 875mg+Clavul. pot 125mg	諾快寧膜衣錠1000毫克	膜衣錠	錠劑需整顆吞服，不可咀嚼。如有需要可將錠劑分開成兩半以利吞服，但不可咀嚼。因若磨粉容易吸潮，加上clavulanic acid對潮濕敏感，藥效降解速度快，故不建議磨粉及泡水分次使用。
CUR03	Curam OD tab 1000mg	Amoxicillin 875mg,Clav 125mg tab	諾快寧口溶錠1000毫克	口溶錠	口溶錠可先與半杯水(至少30mL)攪拌後再吞服；或是放入口中，待口溶錠崩散後再吞服
BD250	Cymbalta cap 30mg	Duloxetine cap 30mg	千憂解	腸溶微粒膠囊	內含腸溶緩釋型小顆粒，應整粒吞服。不可咀嚼或壓碎。勿打開膠囊及將膠囊內容物與食物或液體混和服用。
BD240	Dasatinib tab 50mg	DASATINIB TAB 50MG	柏萊膜衣錠 50 毫克	膜衣錠	需整粒吞服；有可能致畸胎。
DEL05	Delstrigo@ tab 100/300/300mg	DOR/3TC/TDF@ tab 100/300/300mg	達滋克膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服(根據 EACS Guidelines, version 10.1, 2020)
BT410	Detrusitol SR 4mg	TOLTERODINE SR CAP 4MG	得舒妥持續性膠囊	持續性膠囊	磨粉後破壞控制釋放的設計。
DEX01	Dexlansoprazole cap 60mg	DEXLANSOPRAZOLE SR CAP 60MG	得喜胃通60毫克緩釋膠囊	緩釋膠囊	必須整粒吞服，若無法整粒吞服時可打開膠囊，將藥粉顆粒灑入1湯匙果醬內立刻服下，不可咀嚼藥粉顆粒。
DIA07	Diacomit cap 250mg	Stiripentol cap 250mg	戴克爾 膠囊250毫克	膠囊	必須整顆吞服，不可打開膠囊或壓碎

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AD970	Dialicon tab 120mg	Dialicon tab 120mg	加利康錠	錠劑	內含pancreatin, lipase 故建議整粒吞服。
AD450	Diltiazem tab 90mg	Diltiazem retard tab 90mg	凱帝心徐放錠	持續釋放錠	應整粒吞服, 不可剝半或嚼碎。
DOV01	Dovato@ tab 50/300mg	Dolutegravir/Lamivudine @50/300mg	洛瓦核膜衣錠50/300毫克	膜衣錠	無法吞嚥整顆錠劑的病人, 可使用切藥器將藥切成兩半, 切開後應立即服用完整的劑量。
AD890	Doxycycline cap	DOXYCYCLINE HCl EC-CAP 100MG	多喜靈素腸溶膠囊	腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊, 整顆吞服或可打開膠囊, 但不可嚼碎顆粒, 避免對胃部產生刺激性。
DU001	DUOdart CAP 0.5/0.4mg	DUTASTERIDE/TAMSULO SIN 0.5/0.4MG	多適達膠囊 0.5/0.4mg	膠囊	膠囊需整顆吞服, 不可咀嚼、碾碎或打開使用。直接接觸硬膠囊內之dutasteride, 可能會對口咽部黏膜造成刺激。
DUR07	Durotine cap 60mg	Duloxetine cap 60mg	杜憂停膠囊60毫克	腸溶緩釋型小顆粒	內含腸溶緩釋型小顆粒, 應整粒吞服。不可咀嚼或壓碎。勿打開膠囊及將膠囊內容物與食物或液體混和服用
DUT01	Duta cap 0.5mg	Dutasteride cap 0.5mg	尿暢軟膠囊0.5毫克	軟膠囊	軟膠囊需整顆吞服
DUX01	Duxetine cap 30mg	Duloxetine cap 30mg	萬憂停膠囊30毫克	腸溶緩釋型小顆粒	內含腸溶緩釋型小顆粒, 應整粒吞服。不可咀嚼或壓碎。勿打開膠囊及將膠囊內容物與食物或液體混和服用
EFE01	Effexor-XR cap 75mg	Venlafaxine-XR cap 75mg	速悅持續性藥效膠囊 75毫克	持續性藥效膠囊	持續性藥效膠囊, 必須配開水整顆吞服; 切勿咀嚼、壓碎、剝半或放入水中使用。可將膠囊小心打開, 將內容物倒在湯匙內與開水一起立即吞服。
AV440	EM Voren cap 50mg	DICLOFENAC EM CAP 50MG	非炎腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊, 可打開膠囊, 但不可嚼碎顆粒, 避免對胃部產生刺激性。
END01	Endoxan tab 50mg	Cyclophosphamide tab 50mg	癌德星錠50毫克	糖衣錠	為口服抗癌藥, 有可能致畸胎, 不宜磨粉。
EPB01	EpbutoL tab 400mg	Ethambutol tab 400mg	易復癆錠	錠劑	磨粉後易潮解(請於服用前才磨粉)
EPC01	Epclusa tab 400/100mg	Sofosbuvir, Velpatasvir 400/100mg	宜譜沙膜衣錠	膜衣錠	本品帶有苦味, 建議不要將膜衣錠嚼碎或研碎使用, 需整粒吞服。
ERL01	Erleada film-coated tab 60mg	Apalutamide film-coated tab 60mg	安列康膜衣錠60毫克	膜衣錠	錠劑需整顆吞服
AE320	Esomeprazole tab	Esomeprazole tab 40mg	耐適恩錠	腸溶錠	必需整顆吞服, 不要咀嚼、或壓碎藥錠。由N-G 給藥時, 可將藥錠放入50 ml 水中, 不可使用其他液體, 以免腸衣膜被破壞; 待藥錠溶解後, 立即或於30 分鐘內由N-G 給藥, 再以至少30 ml 的水沖N-G 管子使藥物完全進入胃內。
AR070	Evista tab 60mg	Raloxifene tab 60mg	鈣穩膜衣錠	錠劑	不宜磨粉; 致畸胎可能(teratogenic potential), 避免皮膚直接接觸。
AR380	Exelon cap 4.5mg	RIVASTIGMINE HYDROGEN TART.4.5MG	憶思能膠囊	膠囊	需整顆吞服。若無法整粒吞服時, 可以少量水或果汁混合後, 馬上喝下。
FEN01	Fenolip-U tab 160mg	Fenofibrate-U tab 160mg	祛脂優錠160毫克	錠劑	微粒化劑型; 與食物併服, 須整粒吞服, 勿嚼碎、弄破或搗碎。
FEN03	Fentora buccaL tab 100mcg	Fentanyl buccaL tab 100mcg	吩妥拉口頰錠 100微公克	口頰錠	不可將口頰錠切割、粉碎、吸入、咀嚼或整顆吞服, 因這會導致血漿濃度比依照指示使用時為低。
AF740	Ferrous Gluco-B	Ferro.Gluconate 0.3g+Vit.B1+VitC	維他葡萄糖鐵糖衣片	糖衣錠	此為鐵劑, 不宜磨粉。
AF690	FinTA tab 5mg	FINASTERIDE TAB 5MG	快得膜衣錠	膜衣錠	懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的錠劑
FOS01	Fosamax Plus 70+5,600U	Alendronate plus 70mg+D3-5,600U	福善美保骨錠 70+5,600U	錠劑	主成分Alendronate對食道黏膜具刺激性, 需整粒吞服, 不宜剝半、磨粉; 服用時須配服一大杯水。由N-G給藥時, 可將藥錠以約10mL的水溶解後, 立即給藥再以50 mL的水沖N-G管子使藥物完全進入胃內。
NIN01	Free-2.3mg Ixazomib cap	Free-Ixazomib cap 2.3mg		膠囊	整顆膠囊以水送服, 不可壓碎、咀嚼或打開膠囊。
AB930	Free-30mg Afatinib tab	Free-30mg Afatinib tab	妥復克膜衣錠30毫克	膜衣錠	藥粒需整顆吞服, 無法吞服藥粒的病人, 可將藥錠放入100毫升飲用水中攪拌溶解後立即使用, 再以100毫升飲用水潤洗殘留在杯中藥物並服下。以此方式可經由鼻胃管給藥。
NIN02	Free-3mg Ixazomib cap	Free-Ixazomib cap 3mg		膠囊	整顆膠囊以水送服, 不可壓碎、咀嚼或打開膠囊。
JAK01	Free-Jakavi tab 5mg	Ruxolitinib tab 5mg-FREE	捷可衛錠5毫克	錠劑	必須整顆吞服, 不可切開、敲碎或咀嚼。從NG tube 管灌時, 一顆加入40mL水中, 攪拌10分鐘後給藥, 再以75mL水沖洗NG tube; 藥錠崩散於水後應在6小時內服用完畢。
LYN01	Free-Lynparza cap 50mg	Olaparib cap 50mg-Free		膠囊	必須完整吞服整粒錠劑, 不可咀嚼、壓碎、溶解或剝半。
TAG01	Free-Osimertinib 80mg 10tab/box	Free-Osimertinib 80mg 10tab/box	Free-泰格沙膜衣錠 80毫克 10顆/盒	膜衣錠	1.屬危害性藥物, 給藥時請小心(如帶手套、穿防護衣)。 2.錠劑必須整顆吞服, 不可以敲碎或磨粉。 3.遇吞嚥困難病人, 可將錠劑加入50mL開水, 攪拌均勻使崩散後立刻喝下或從N-G管灌; 再以120至240mL白開水潤洗杯子後, 立即喝下或從N-G管灌。
STR01	Free-Strattera cap 10mg	ATOMOXETINE CAP 10MG FREE	思銳膠囊10毫克	膠囊	藥品具有刺激性, 建議整粒吞服。
TAG02	Free-Tagrisso tab 80mg	Free-Osimertinib tab 80mg	泰格沙膜衣錠80毫克	膜衣錠	錠劑必須整顆吞服, 不可以敲碎或磨粉。遇吞嚥困難病人, 可將錠劑加入50西西白開水, 攪拌均勻使崩散後立刻喝下或從N-G管灌; 再以120至240西西白開水潤洗杯子後, 立即喝下或從N-G管灌。
FYC01	Fycompa tab 2mg	Perampanel tab 2mg	癲控達膜衣錠2毫克	膜衣錠	不可咀嚼、壓碎或剝半服用。無剝半線, 無法準確剝半。為確保患者服用完整劑量, 應整錠吞服, 不可咀嚼或壓碎。
FYL01	Fylin tab 400mg	PENTOXIFYLLINE TAB 400MG	暢循持續性膜衣錠	持續釋放錠	應整粒吞服, 不可磨粉。
GEF01	Gefitinib Sandoz tab 250mg	Gefitinib tab 250mg	基扶能膜衣錠250毫克	膜衣錠	為口服抗癌藥; 可將藥錠, 放入半杯飲用水中, 攪拌直到藥錠溶解後, 立即喝下, 再以半杯水沖洗杯子並喝下。此溶液也可經由鼻胃管灌。
AG480	Gefitinib tab-250	Gefitinib tab 250mg	艾瑞莎膜衣錠	膜衣錠	口服抗癌藥, 需整粒吞服; 或將藥錠, 放入半杯飲用水中, 攪拌直到藥錠溶解後, 立即喝下, 再以半杯水沖洗杯子並喝下。此溶液也可經由鼻胃管灌。
GEN04	Genvoya@ tab	Tenof.emtrici.elviteg.cob icistat	捷扶康膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服, 勿咀嚼、壓碎或剝半。
AI130	Glivec tab 100mg	IMATINIB TAB 100MG	基利克膜衣錠100毫克	膜衣錠	為口服抗癌藥; 無法吞服者可將藥錠放入飲用水或蘋果汁中(100 mg 用50mL, 400 mg 用200 mL) 攪拌直到藥錠崩解呈懸浮液, 立即喝下, 再以半杯水沖洗杯緣服下。
GLU10	Glucomin X.R. tab 500mg	Metformin tab 500mg	立克爾緩釋錠500毫克	持續釋放錠	可剝半, 但不可以壓碎或研磨。磨粉後破壞控制釋放設計
GLY03	Glyxambi tab 25/5mg	Empagliflozin/Linagliptin 25/5mg	糖順平膜衣錠25/5毫克	膜衣錠	複方不建議磨粉

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研審建議(藥品手冊)
HAR02	Harvoni tab 90/400mg	Ledipasvir,Sofosbuvir 90/400mg	夏奉寧膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服
AM010	HBS Madopar-125mg	L-DOPA 100MG+ BENSERAZIDE 25MG	美道普持續藥效膠囊	持續釋放膠囊	應整粒吞服，打開膠囊給藥會破壞控制釋放的設計。 Madopar HBS 進入胃內，外部膠囊殼破裂後，與 Madopar 藥物相混合的賦型劑 hydrocolloid 會將 Madopar 包覆形成一膠狀物，慢慢使之釋放出來；以維持穩定之血中濃度。
HIR02	Hiros cap 5/120mg	Cetirizine/Pseudoephedrine 5/120	喜洛緩釋微粒膠囊	緩釋微粒膠囊	緩釋微粒膠囊，請整粒吞服，勿咬碎或磨粉使用
AH250	Hydrea cap 500mg	HYDROXYUREA CAP 500MG	愛治膠囊	膠囊	接觸到粉末可能引起嚴重的皮膚毒性，醫療人員給此藥時應帶上手套。
AH600	Hyzaar 100/12.5 mg	LOSARTAN/DITHIAZIDE 100/12.5MG	好悅您	膜衣錠	複方劑型，宜整粒吞服
ICL01	Iclusig tab 15mg	Ponatinib tab 15mg	英可欣膜衣錠15毫克	膜衣錠	可與食物一起服用或單獨服用，應整粒吞服。不可壓碎或溶解錠劑
IMB01	Imbruvica cap 140mg	Ibrutinib cap 140mg	億珂膠囊140毫克	膠囊	需整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼
ISO05	Isoptin SR tab 240mg	Verapamil SR tab 240mg	心舒平持續性膜衣錠	持續性膜衣錠	應整粒吞服，不可敲碎或嚼碎
ISO03	Isormol tab 20mg	Isosorbide 5-Mononitrate tab20mg	愛速脈錠	錠劑	仿單：不可咬碎
AI590	Isotretinoin cap 20mg	Isotretinoin cap 20mg	羅可坦軟膠囊	軟膠囊	具黏膜刺激性及致畸胎性，不宜磨粉或咀嚼。
IVI02	Ivic tab 100mg	Imatinib tab 100mg	癌微可膜衣錠100毫克	膜衣錠	口服抗癌藥；無法吞服者可將藥錠放入飲用水或蘋果汁中（100 mg 用50mL，400 mg用200 mL）攪拌直到藥錠崩解呈懸浮液，立即喝下，再以半杯水沖洗杯緣服下。
JUL01	Juluca@ tab 50/25mg	Dolutegravir/Rilpivirine	滋若愷膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服（根據 EAACS Guidelines, version 10.1, 2020）
AT590	Juvela-N cap 200mg	TOCOPHEROL CAP 200MG	高育維軟膠囊	軟膠囊	軟膠囊不宜磨粉
AL140	Keppra tab 500mg	Levetiracetam tab 500mg	優閒膜衣錠	膜衣錠	有特殊苦味，不宜磨粉。
KIS02	Kisqali tab 200mg	Ribociclib tab 200mg	擊癌利200毫克	膜衣錠	藥錠應整顆吞服(吞服前不可咀嚼、壓碎或剝開藥錠)。藥錠若裂開、破碎或不完整，請勿服用。
KMY01	K-mycin tab 500mg	Clarithromycin tab 500mg	克那每欣膜衣錠500毫克	膜衣錠	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半
BS390	Kuvan tab 100mg	SAPROPTERIN TAB 100MG	酷方100毫克	水溶性錠	水溶性錠易受潮，不適合磨粉儲存，使用前溶於水服用
LAN05	Lanapine tab 10mg	Olanzapine tab 10mg	樂安神口溶錠10毫克	口溶錠	1. 口溶錠應置於口中，它會迅速分散於唾液中之故容易吞服。要完整地將整顆口溶錠從口中取出是困難的。 2. 可置於口中或將它分散在水或合適的飲料(柳丁汁、蘋果汁、牛奶或咖啡)中服用。 3. 因為口溶錠易碎，所以由包裝取出後應立刻服用。
AL450	Lapatinib tab250mg	Lapatinib tab 250mg	泰嘉錠膜衣錠	膜衣錠	應整顆吞服，不可以咀嚼、剝半或磨粉。
LEA01	Leavdo cap 10mg	Lenalidomide cap 10mg	瑞伏駁膠囊10毫克	膠囊	化療藥品，必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊
LES01	Lesiton cap 5mg	Dihydroergotamine cap 5mg	樂息痛膠囊5毫克	持續釋放膠囊	持續釋放膠囊，需整粒吞服，磨粉後破壞控制釋放的設計，不可剝半或磨粉。
LOR03	Lorviqua tab 25mg	Lorlatinib tab 25mg	瘤利劑膜衣錠25毫克	膜衣錠	必須以至少240mL的水完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎或剝半。
LYN02	Lynparza tab 150mg	Olaparib tab 150mg	令癌莎膜衣錠150毫克	膠囊	必須完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎、溶解或剝半。
OPS01	Macitentan tab 10mg	Macitentan tab 10mg	傲朴舒膜衣錠10毫克	膜衣錠	應以開水整錠吞服；不可以剝半、弄碎或嚼碎。
MAV02	Mavenclad tab 10mg	Cladribine tab 10mg	瑪威克錠10毫克	錠劑	需整粒吞服，不可研磨、剝半、咀嚼
MAV01	Maviret tab 100mg/40mg	Glecaprevir/Pibrentasvir 100/40mg	艾百樂膜衣錠100毫克/40毫克	膜衣錠	需整粒吞服，要服用時才將藥物從包裝中取出。
MAY01	Mayzent F.C tab 2mg	Siponimod F.C tab 2mg	美芬太2毫克膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，不可研磨、剝半、咀嚼
MEG01	Megazon PR tab 50mg	Quetiapine PR tab 50MG	美加柔持續藥效膜衣錠50毫克	持續釋放錠	必須整粒吞服，不可以剝半、咀嚼、或壓碎。
MEK01	Mekinist tab 2mg	Trametinib tab 2mg	麥欣寬膜衣錠2毫克	膜衣錠	口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
MET17	MetaCu cap 300mg	Trientine cap 300mg	解銅膠囊300毫克	膠囊	應整粒吞服，不可以打開或咀嚼，因其成分對黏膜有刺激性。
MEZ01	Mezavant XL tab 1.2g	MESALAZINE TAB 1200MG	安適凡特長效腸溶錠	長效腸溶錠	必須整粒吞服，不可嚼碎或剝半
MIR01	Mirtapine OD tab 30mg	MIRTAZAPINE OD TAB 30MG	美妥平口溶錠30毫克	口溶錠	口溶錠應置於口中，它會迅速分散於唾液中之故容易吞服。
BM340	Mitotane tab 500mg	MITOTANE TAB 500MG		錠劑	化療藥品，不可以壓碎或磨粉，拿取時應做好防護措施(例如帶手套)
AM880	Moxifloxacin tab	MOXIFLOXACIN HCl TAB 400MG	威洛速膜衣錠	膜衣錠	有特殊的味道，建議整粒吞服（仿單）
AM980	Myfortic tab 180mg	MYCOPHENOLATE TAB 180MG	睦體康腸衣錠	腸溶錠	需整粒吞服；可能致畸胎，避免直接皮膚接觸。
NEP01	Nephoxil cap 500mg	Ferric citrate cap 500mg	拿百磷膠囊500毫克	膠囊	需整粒吞服，不應剝開或磨碎。
NER01	Nerlynx tab 40mg	Neratinib tab 40mg	賀儂安膜衣錠40毫克	膜衣錠	需整粒吞服，不可以剝半、咬碎、咀嚼
AS670	NexAVAR tab 200mg	Sorafenib tab 200mg	蕾莎瓦膜衣錠	膜衣錠	應整顆吞服，鼻胃管病人使用，不可直接磨粉，請將整顆錠劑放入冷白開水中攪拌崩解後立刻服用，再以半杯水沖洗杯緣服下
NIF01	Nifedipine S.R.F.C tab 30mg	Nifedipine tab 30mg	恆脈循持續性膜衣錠30毫克	持續性膜衣錠	持續釋放錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎
AN280	Nimotop tab 30mg	NIMODIPINE TAB 30MG	腦妥膜衣錠	膜衣錠	有特殊味道，需整粒吞服，不宜磨粉。
NIN03	Ninlaro cap 4mg	Ixazomib cap 4mg	免瘤諾膠囊4毫克	膠囊	具黏膜刺激性及致畸胎性，不宜磨粉或咀嚼。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AN360	Nitrostat tab 25's	NITROGLYCERIN TAB 25'S	耐紋寧錠	舌下含錠	不可磨粉或直接吞服，只適於舌下使用。
NOR01	Norina tab 5mg	Norethindrone acetate tab 5mg	諾莉娜錠5毫克	錠劑	不建議磨粉，應整粒吞服(仿單)
NUB02	Nubeqa F.C. tab 300mg	Darolutamide F.C. tab 300mg	諾博戈膜衣錠300毫克	膜衣錠	應整顆吞服，不可咀嚼、咬碎或剝開
NUM01	Numient ER cap 48.75/195mg	Carbidopa 48.75/Levodopa 195	瑞多寧緩釋膠囊 48.75/195毫克	緩釋膠囊	應整顆吞服，不可咀嚼或壓碎。吞嚥膠囊有困難者，可打開膠囊後將內容物撒在少量軟性食物上(例如蘋果醬、優格或布丁)立即服用，但不可咀嚼或壓碎小顆粒。
HAR01	OCAS Harnalidge 0.4 mg	TAMSULOSIN OCAS PR TAB 0.4 MG	活路利淨持續性錠 0.4毫克	持續釋放錠	為持續性藥效膜衣錠，必須整粒吞服不可磨碎或咀嚼。
ODE01	Odefsey@ tab	Emtricitabine/Rilpivirine/TAF	安以斯膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，不可嚼碎、磨碎或剝開。
OFE01	Ofev cap 150mg	Nintedanib ethanesulfonate 150mg	抑肺纖軟膠囊150毫克	軟膠囊	搭配液體飯後整顆吞服，味道很苦勿咬碎或咀嚼。
OLU01	Olumiant tab 4mg	Baricitinib tab 4mg	愛滅炎膜衣錠4毫克	膜衣錠	味道很苦，請整粒吞服
OMA01	Omacor cap 1000mg	Omega-3-Acid Ethyl Esters 90	脂妙清軟膠囊1000毫克	軟膠囊	軟膠囊需整顆吞服
OSE01	Oseni Tablets 25mg/30mg	Alogliptin/PIOGLITAZON E 25/30mg	歐欣尼膜衣錠25/30毫克	膜衣錠	複方必須整錠吞服，不可剝開。
AO330	Oxibu extend tab 5mg	OXYBUTYNYN EXTEND TAB 5MG	歐舒緩釋錠 5 毫克	持續釋放錠	持續釋放錠，應整粒吞服，不能咀嚼或壓碎，可剝半使用。
OXY01	OxyNorm IR cap 5mg	Oxycodone IR cap 5mg	奧諾美5毫克速效膠囊	膠囊	1. 需整粒吞服，若切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解後，將導致藥物迅速釋出，進而提高用藥過量與死亡的風險。 2. 遇無法將整粒膠囊吞下者，可將膠囊內容物撒在柔軟食物上(如冰淇淋，布丁，優格)後立即吞下，再喝水潤口確保所有藥物皆服下。 3. 遇N-G feeding或gastrostomy者先以水加入管路，打開膠囊將內容物直接倒入管路，接著用15mL水沖洗管路，再以10mL水多沖洗2次以上。也可以用牛奶或液態營養補充物取代水。(micromedex)
OZA01	Ozapex OD tab 5mg	Olanzapine OD tab 5mg	悠悅平口溶錠5毫克	口溶錠	1. 口溶錠應置於口中，它會迅速分散於唾液中之故容易吞服。要完整地將整顆口溶錠從口中取出是困難的。 2. 可置於口中或將它分散在水或合適的飲料(柳丁汁、蘋果汁、牛奶或咖啡)中服用。 3. 因為口溶錠易碎，所以由包裝取出後應立刻服用。
BP290	Paliperidone tab-3	PALIPERIDONE TAB 3MG	思維佳持續錠 3 毫克	持續釋放錠	需整粒吞服；不可咬碎、分割或磨碎藥錠。是一種OROS 滲透壓控制釋出的口服劑型
AP110	Pantoloc tab 40mg	PANTOPRAZOLE TAB 40MG	治潰樂腸溶膜衣錠	腸溶錠	磨粉後會破壞腸衣，故建議整粒吞服
PAX01	Paxlovid=Nir.150mg* 2/Rit.100mg*1	Nirmatrelvir 150/Ritonavir 100mg	莫納皮拉韋	膜衣錠	需整顆吞服，不得咀嚼、分開或壓碎。 若確實需管灌給藥的話，可參考廠商提供的「Paxlovid經管灌給藥資料_1111007-2022/10、Paxlovid 經管灌給藥用藥指導單張 2022/10」方式處理，但廠商聲明「Paxlovid 錠劑未被核准經由管灌給藥。輝瑞不建議以這種方式使用 Paxlovid」
BP590	Pazopanib tab200mg	PAZOPANIB TAB 200MG	福退癌膜衣錠	膜衣錠	需整粒空服服用，不可剝半或磨粉。請勿壓碎藥錠，因為可能會增加吸收速率而影響全身暴露量。
AP630	Phyllocontin 225mg	PHYLLCONTIN 225MG	菲康汀持續性藥效錠	持續釋放錠	可剝半但不能咀嚼或壓碎，以免其中Aminophylline快速釋出，可能造成毒性。(依據仿單)
PLU01	PlusDmax 70mg+D3- 2,800iu	Alendronate plus 70mg+D3-2,800iu	杏節挺錠	錠劑	主成分Alendronate對食道黏膜具刺激性，需整粒吞服，不宜剝半、磨粉；服用時須配服一大杯水。由N-G給藥時，可將藥錠以約10mL的水溶解後，立即給藥再以50 mL的水沖N-G管子使藥物完全進入胃內。
AP440	Propafenone tab 150mg	Propafenone tab 150mg	心利正膜衣錠	膜衣錠	具苦味和表面麻醉的作用，應整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼。
AF200	Propecia tab 1mg	Finasteride tab 1mg	柔沛膜衣錠	膜衣錠	懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的錠劑
QTE01	Qtern tab 5mg/10mg	Saxagliptin/Dapagliflozin 5/10mg	控糖穩膜衣錠5毫克 /10毫克	膜衣錠	複方請整錠吞服，勿壓碎、切開或咀嚼
QUE01	Quelip XR tab 200mg	Quetiapine XR tab 200mg	潰益平持續性藥效膜衣錠200毫克	持續性藥效膜衣錠	必須整粒吞服，不可以剝半、咀嚼、或壓碎
RAL02	Ralo tab 60mg	Raloxifene tab 60mg	樂骨康膜衣錠60毫克	膜衣錠	不宜磨粉；致畸胎可能(teratogenic potential)，避免皮膚直接接觸。
XR520	Raltegravir@tab400	RALTEGRAVIR@ TAB 400MG	宜昇瑞膜衣錠	膜衣錠	膜衣錠需整粒吞服，因The bioavailability of the chewable tablet is higher: 300 mg chewable tablet (= 400 mg film-coated tablet)
RHY01	Rhynorm tab 150mg	Propafenone tab 150mg	律諾膜衣錠150毫克	膜衣錠	具苦味和表面麻醉的作用，應整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼。
RIN05	Rinvoq E.R tab 15mg	Upadacitinib E.R tab 15mg	銳虎持續性藥效錠15毫克	持續性藥效錠	需整粒吞服，不可研磨、剝半、咀嚼
AR310	Rivastigmine 1.5mg	RIVASTIGMINE CAP 1.5MG	憶思能膠囊	膠囊	需整顆吞服。若無法整粒吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
ROZ01	Rozerem tab 8 mg	RAMELTEON TAB 8 MG	柔速瑞膜衣錠8毫克	膜衣錠	仿單建議，務必整粒吞服。
ROZ02	Rozlytrek cap 200mg	Entrectinib cap 200mg	羅思克200毫克膠囊	膠囊	應整顆吞服。不可打開、壓碎、咀嚼或溶解內容物
RYD01	Rydapt soft cap 25mg	Midostaurin soft cap 25mg	療德妥軟膠囊25毫克	軟膠囊	屬危害性藥物，給藥時請小心(如帶手套)，必須整顆吞服，不可以敲碎或磨粉。
SAL05	Salazine tab 500mg	Sulfasalazine tab 500mg	撒樂腸溶錠500毫克	腸溶錠	腸溶錠勿咬碎，磨粉後會對胃腸道產生刺激性。
SMY01	Smyraf film-coated tab 50mg	Peficitinib film-coated tab 50mg	施貝福膜衣錠50毫克	膜衣錠	需整粒吞服，不可研磨、剝半、咀嚼
SOL06	Solinacin F.C. tab 5mg	Solifenacin succinat tab 5mg	中化利平順膜衣錠5毫克	膜衣錠	本品帶有苦味，建議不要將膜衣錠嚼碎或研碎使用，需整粒吞服。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
STI02	Stivarga tab 40mg	REGORAFENIB TAB 40MG	癌瑞格膜衣錠40毫克	膜衣錠	需整粒吞服，勿嚼碎、弄破或搗碎
BA710	Strattera cap 25mg	ATOMOXETINE CAP 25MG	思銳膠囊 2.5 毫克	膠囊	藥品具有刺激性，建議整粒吞服。
BS320	Strocaïn TAB	OXETHAZAINE 5MG/POLYMIGEL 244MG	息痛佳音錠	錠劑	內含麻醉性止痛成分，應整粒吞服，不可咀嚼或咬碎以免產生麻木感。
AS530	Sunitinib cap-12.5	SUNITINIB CAP 12.5MG	舒癌特膠囊12.5毫克	膠囊	需整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼
SUP05	Superocin film-coated tab 250mg	Ciprofloxacin f.c. tab 250mg	速倍樂膜衣錠250毫克	膜衣錠	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半
SYM02	Symtuza@ film-coated tab	DRV\cobicistat\FTC\TAF@ tab	信澤力膜衣錠	膜衣錠	無法吞嚥整顆錠劑的病人，可使用切藥器將藥切成兩半，切開後應立即服用完整的劑量。
REN02	Tab Renvela 0.8g	Sevelamer carbonate tab 0.8g	磷減藥錠	膜衣錠	需整顆吞服，不可磨碎、咀嚼或剝開藥品。
AS460	Tab SIROLimus 1mg	Sirolimus tab 1mg	斥消靈錠1毫克	糖衣錠	它是一種利用NanoCrystal technology做成的特殊劑型，必須整粒吞服，不可以嚼碎、弄破或搗碎。
TAB01	Tabrecta tab 200mg	Capmatinib tab 200mg	泰芮塔200毫克膜衣錠	膜衣錠	需整顆吞服，請勿剝半、研磨或咀嚼
BT580	Tadalafil tab 5mg	TADALAFIL TAB 5MG	犀利士 5 毫克	膜衣錠	應整顆吞服，不可剝半
TAF01	Tafinlar cap 75mg	Dabrafenib cap 75mg	泰伏樂膠囊75毫克	膠囊	屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套）。膠囊應以水整粒吞服，勿嚼碎、弄破、或打開
TAG03	Tagrisso tab 80mg	Osimertinib tab 80mg	泰格沙80毫克	膜衣錠	錠劑必須整顆吞服，不可以敲碎或磨粉。遇吞嚥困難病人，可將錠劑加入50西西白開水，攪拌均勻使崩散後立刻喝下或從N-G管灌；再以120至240西西白開水潤洗杯子後，立即喝下或從N-G管灌
TAL03	Talzenna cap 0.25mg	Talazoparib cap 0.25mg	達勝癌膠囊0.25毫克	膠囊	抗癌藥物，需整粒吞服，請勿打開或溶解
TAM05	Tamso SR cap 0.2mg	Tamsulosin HCl SR cap 0.2mg	替你坦舒持續釋放膠囊0.2毫克	持續釋放膠囊	不宜磨粉，劑型為持續釋放膠囊，破壞劑型可能會影響其藥動學。
AN740	Tasigna cap 150mg	NILOTINIB CAP 150MG	泰息安膠囊150毫克	膠囊	整粒吞服，勿將膠囊打開或咬碎。破壞膠囊可能會使血中濃度增加、增加毒性。(ISMP)
TEC06	Tecfidera cap 240mg	Dimethyl fumarate cap 240mg	泰福德膠囊240毫克	膠囊	腸溶衣膠囊應整粒吞服，不要壓碎、溶解、拆開或咀嚼，避免腸道刺激。
AT130	Tegretol CR-200mg	CARBAMAZEPINE CR TAB 200MG	癲通長效膜衣錠	長效膜衣錠	磨粉後破壞控制釋放的設計，造成血中濃度不穩定，但可剝半。
TEP02	Tepmetko tab 225mg	Tepotinib tab 225mg	德邁特膜衣錠225毫克	膜衣錠	需整顆吞服，請勿剝半、研磨或咀嚼
AT950	Topamax tab 100mg	Topiramate tab 100mg	妥泰膜衣錠100毫克	膜衣錠	1. Topiramate有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物/食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。
NI010	TPOG-Roaccutane 20mg	TPOG-Isotretinoin cap 20mg	羅可坦軟膠囊	軟膠囊	具黏膜刺激性及致畸胎性，不宜磨粉或咀嚼
BT390	Trientine 300mg	TRIENTINE CAP 300MG		膠囊	應整粒吞服，不可以打開或咀嚼，因其成分對黏膜有刺激性。
TWY10	Twynsta tab 80/5mg	Telmisartan/Amlodipine 80/5mg	倍必康平錠80/5毫克	錠劑	錠劑具吸濕性，從鋁箔片取出後，應整顆立即吞服，磨粉後易潮解，且需避免潮濕與光照
AU040	Ufur cap	TEGAFUR 100MG+URACIL 224MG	友復膠囊	膠囊	口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
UPT04	Uptravi tab 200mcg	Selexipag tab 200mcg	尚達利膜衣錠200微克	膜衣錠	需整粒吞服，不可將藥錠剝半、壓碎或咀嚼，並應以白開水吞服。
UPT05	Uptravi tab 600mcg	Selexipag tab 600mcg	尚達利膜衣錠600微克	膜衣錠	需整粒吞服，不可將藥錠剝半、壓碎或咀嚼，並應以白開水吞服。
UPT06	Uptravi tab 800mcg	Selexipag tab 800mcg	尚達利膜衣錠800微克	膜衣錠	需整粒吞服，不可將藥錠剝半、壓碎或咀嚼，並應以白開水吞服。
AV320	ValCYTE tab 450mg	Valganciclovir tab 450mg	克毒癩膜衣錠	膜衣錠	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎，致畸胎可能；避免直接與皮膚接觸。
VER03	Verquvo f.c tab 10mg	Vericiguat micronized tab 10mg	偉卡沃10毫克膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，對於無法吞服整顆藥錠的病人，可在服藥前將藥品磨碎，並立即與水混和服用
VER01	Verzenio tab 150mg	Abemaciclib tab 150mg	捷癌寧膜衣錠150毫克	膜衣錠	應整顆吞服，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服
BS500	Vesicare tab 5mg	SOLIFENACIN SUCCINAT TAB 5MG	衛喜康膜衣錠 5 毫克	膜衣錠	不宜磨粉，需整粒吞服（因味苦具刺激性）
VET01	Vetawon tab 5mg	Tadalafil tab 5mg	佳倍壯膜衣錠5毫克	膜衣錠	應整顆吞服，不可剝半
VIN03	Vinobin soft cap 20mg	Vinorelbine soft cap 20mg	威若賓20毫克軟膠囊	軟膠囊	口服抗癌藥；需以冷開水整顆吞服，不可磨粉、嚼食或剝開。
AFI10	Votubia tab 2.5mg	Everolimus tab 2.5 mg	愛服妥錠 2.5 毫克	錠劑	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有30mL水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以30mL水潤洗容器後服下。
VYN01	Vyndamax cap 61mg	Tafamidis soft cap 61mg	維萬心軟膠囊61毫克	軟膠囊	軟膠囊需整顆吞服，不可壓碎或切開
WON01	Wontran ER tab 75/650mg	Tramadol/Scanol ER tab 75/650mg	保寧緩釋錠	緩釋錠	緩釋劑型，需整粒吞服，不可咬碎剝半或磨粉
XAN02	Xanthium cap 200mg	Theophylline cap 200mg	善寧持續性藥效膠囊	持續釋放膠囊	不可嚼碎或壓碎其內顆粒
AC830	Xeloda tab 500mg	Capecitabine tab 500mg	截瘤達錠	膜衣錠	口服抗癌藥，應整粒吞服，不可壓碎或切割
XIG01	Xigduo XR tab 10/1000mg	Dapagliflozin/Metformin 10/1000	釋多糖持續藥效膜衣錠10/1000毫克	持續性膜衣錠	複方必須整粒吞服，切勿磨碎、切割或嚼碎。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
FM100	XL Morphine-60 cap	MORPHINE SULFATE CAP 60MG	默痛舒持續性膠囊	持續釋放膠囊	1.持續釋放膠囊，應整粒吞服，請勿壓碎或嚼碎膠囊及其小顆粒。 2.對於使用管灌餵食病人，可以打開膠囊，將內含的小顆粒撒於流質或不含酒精的冷飲料中給與管灌；但絕對不可以加入白開水或生理食鹽水中，以免凝結成塊。
AB850	XL Wellbutrin-150	BUPROPION XL TAB 150 MG	威克倦持續性藥效錠	持續釋放錠	為持續釋放錠，應整粒吞服，不可壓碎或嚼碎。
XTA01	Xtandi cap 40mg	Enzalutamide cap 40mg	安可坦軟膠囊40毫克	軟膠囊	屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套）。膠囊應以水整粒吞服，勿嚼碎、弄破、打開或融化
ZCO01	Zcough cap 100mg	Benzonatate soft cap 100mg	咳治得軟膠囊100毫克	軟膠囊	若咬碎膠囊，會使口腔粘膜局部麻醉而有梗塞感。
ZEJ01	Zejula cap 100mg	Niraparib cap 100mg	截永樂膠囊100毫克	膠囊	必須整顆吞服，不可咀嚼，壓碎或撥開
ZEL01	Zelboraf tab 240mg	Vemurafenib tab 240mg	日沛樂膜衣錠240毫克	膜衣錠	錠劑應搭配1杯開水整顆吞服，不應咀嚼或咬碎。
ZEP01	Zepatier tab 50/100mg	Elbasvir/Grazoprevir tab50/100mg	賀肝樂膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，且應保存於原本的泡囊包裝中，待使用時再取出，以避免接觸濕氣。
ZYK01	Zykadia cap 150mg	Ceritinib cap 150mg	立克瑪膠囊150毫克	膠囊	膠囊應整顆配水吞服，不可咬碎或磨粉。
ZYP01	Zyprexa Zydis tab 5mg	Olanzapine Zydis tab 5mg	津普速口溶錠5公絲	口溶錠	1. 口溶錠應置於口中，它會迅速分散於唾液中、故容易吞服。要完整地將整顆口溶錠從口中取出是困難的。 2. 可置於口中或將它分散在水或合適的飲料(柳丁汁、蘋果汁、牛奶或咖啡)中服用。 3. 因為口溶錠易碎，所以由包裝取出後應立刻服用。
ZYT01	Zytiga tab 250mg	ABIRATERONE ACETATE TAB 250MG	澤珂錠250毫克	錠劑	必須整顆以水吞服，請勿壓碎或嚼碎。

附註：具有致癌性(carcinogenic)、致畸胎性(teratogenic)、細胞毒性(cytotoxic)的藥物不適合磨粉，因為散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。

參考來源：

- 1.藥品仿單
- 2.Micromedex
- 3.Lexi-Comp ONLINE
- 4.“Do Not Crush List” <http://www.ismp.org/Tools/DoNotCrush.pdf> (www.ismp.org)
5. EACS Guidelines, version 10.1, 2020