

臺中榮民總醫院醫學研究部 豬疼痛評估紀錄表

IACUC NO：		觀察人員：						評估日期：							
計畫主持人/單位： /		動物品種/品系：						動物性別/年齡： <input type="checkbox"/> ♂ <input type="checkbox"/> ♀/							
評估項目		分數	動物編號/Day												
			/D1		/D2		/D3		/D1		/D2		/D3		
			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
傷口	正常	0													
	輕微透明滲出液或鮮紅色血液	1													
	不透明滲出液體或暗褐色血液	2													
	膿樣分泌物	3													
對周遭環境的注意力	有活力，對周遭變化會注意或想探究，正常表現	0													
	皮膚外觀的改變(豎毛、體表黏液分泌)	1													
	步態或姿勢異常(走或站或排尿姿勢異常)	2													
	人員接近仍持續自殘或持續磨擦、舔拭傷口	3													
	人員接近焦慮不安或緊張	4													
	人員接近時發出叫聲且迴避甚至出現攻擊行為	5													
攝食、飲水、排便	攝食、排便、排尿正常	0													
	飼料餵吃完、排便尿減少	1													
	飼料不吃、一天以上無排便	2													
	未排尿	3													
臨床症狀(呼吸、震顫、痙攣、沉鬱臥倒)	呼吸正常	0													
	短暫的流涎或震顫	1													
	間歇性呼吸異常、震顫、痙攣(每次 10 分鐘以下)，或短暫的沉鬱臥倒(1 小時以內)	2													
	持續性呼吸困難、震顫、持續性痙攣(每次超過 10 分鐘，建議安樂死)，持續 1 小時以上鬱臥倒(若超過 2 小時以上則建議安樂死)	3													
觸診反應	深度觸診手術部位不會直接引起周圍組織的反應，動物對觸診無太大反應	1													
	深度觸診手術部位會直接引起對側或肢體的反應，動物對觸診反應尚可接受	2													
	深度觸診手術部位和周圍組織引起劇烈的刺激反應，動物對觸診反應無法接受	3													
	深度觸診手術部位和周圍組織引起劇烈的刺激反應，而非手術部位觸診也引起激烈反應且發出叫聲，對觸診反應非常排斥	4													
總分		0-18													
止痛劑給予(註)	/_____mg/kg														
	/_____mg/kg														
	/_____mg/kg														
是否人道安樂死(如有，請「✓」)															
觀察人員簽名															
正常：0-5 分 輕微疼痛：6-10 分：提供止痛藥品，每 24 小時重新評估動物狀態 中度疼痛：11-15 分：提供止痛藥品，每 8-12 小時重新評估動物狀態。連續 3 次此區分數，考慮給予安樂死。 重度疼痛：16-18 分：提供止痛藥品，若 4 小時內無法緩解動物疼痛，考慮給予安樂死。 使用單位自行留存以供備查。															