

第91次藥事會(107.03.23)品項異動公告

第91次藥事會新增品項公告

會次	商品名	成份規格含量	廠牌	適應症
91次	All-Right Calcium Suspension "Standard" 180ml/Bot	Calcium Phosphate Tribasic 103mg/ml, Vitamin A 1600IU/ml, Vitamin D3 160IU/ml	生達/教康	鈣及維生素A、D缺乏症之治療。
91次	Metronidazol Fresenius 500mg	Metronidazole 500mg/100ml	台灣費森尤斯卡比	厭氧性菌引起之感染症。
91次	Tamso SR Capsules 0.2mg	Tamsulosin HCL SR Cap 0.2mg	五洲/榮慶	前列腺肥大症(增生)所伴隨的排尿障礙。
91次	Zonin S.C. Tablets 50mg	Zotepine S. C. Tab 50mg	瑞士/凱基生技	思覺失調症。
91次	Sketa Capsules "Patron"	Chlorzoxazone 250mg, Acetaminophen 300mg	派頓/平廷	關節痛、肌肉痛、顏面神經痙攣、神經痛、肌肉之痙攣強直及疼痛、肩酸、運動後之酸痛。
91次	Maviret Film-Coated Tablets 100mg/40mg	Glecaprevir 100 mg, Pibrentasvir 40 mg	艾伯維	成人慢性C型肝炎病毒(HCV)基因型1、2、3、4、5或6之感染。
91次	Nebilet 5mg	Nebivolol 5mg	美納里尼	治療原發性高血壓。
91次	Acyclo-H Cream 5gm	Acyclovir 5%, Hydrocortisone 1%	明大化學	用於成人及青少年(12歲(含)以上)復發性唇疱疹的早期治療。
91次	Abraxane for Injectable Suspension 100mg/vial	Nab-Paclitaxel Inj. 100mg/vial	Abraxis BIO Science LLC/賽基	轉移性乳癌 ABRAXANE用於以合併化療治療轉移疾病失敗之乳癌。除非臨床上禁用，否則先前治療應包含一種anthracycline。非小細胞肺癌 對於無法手術或放射治療的患者，ABRAXANE併用carboplatin，做為局部晚期或轉移性非小細胞肺癌之第一線治療。胰腺癌 ABRAXANE合併gemcitabine，做為轉移性胰腺癌患者之第一線治療。
91次	Vectibix Solution for Infusion 100mg/vial	Panitumumab Inj. 100mg	Amgen	治療RAS基因正常之轉移性大腸直腸癌(mCRC)成人病患：1. 與FOLFOX 或FOLFIRI併用作為第一線療法。2. 在接受含有Fluoropyrimidine、Oxaliplatin與Irinotecan之化學療法失敗後，作為單一療法使用。
91次	Inlyta Film-Coated Tablets 5mg	Axitinib F. C. Tab 5mg	Pfizer	治療已接受過sunitinib或cytokine治療失敗的晚期腎細胞癌病患。
91次	Benefix Coagulation Factor IX 1000IU (Recombinant)	rFIX (Nonacog alfa) 1000 IU	惠氏/久裕	控制與預防B型血友病(先天性第九凝血因子缺乏症，或稱聖誕節症)之出血，包括接受外科手術時的出血控制與預防出血。做為常規預防性治療於B型血友病病患(先天性第九凝血因子缺乏症)之出血。
91次	Xyntha Solofuse 1000 IU	Moroctocog alfa 1000 IU	惠氏/久裕	治療和預防A型血友病患者(先天性第八凝血因子缺乏)的出血。

第91次藥事會(107.03.23)品項異動公告

會次	商品名	成份規格含量	廠牌	適應症
91次	Kovaltry Injection 1000 IU	Factor VIII 1000 IU	臺灣拜耳	控制及預防成人及兒童A型血友病病人之出血事件；成人及兒童A型血友病病人手術前中後之處置；作為例行預防，預防或降低成人及兒童A型血友病病人之出血事件發生率。本品不適用於治療 vonWillebrand 疾病。說明：本品用於不曾接受過第八凝血因子治療之A型血友病病人(Previously untreated patients, PUPs)的療效與安全性仍未知。
91次	Kovaltry Injection 500 IU	Factor VIII 500 IU		
91次	Oseni Tablets 25mg/30mg	Alogliptin 25mg, Pioglitazone 30mg	Takeda	Oseni (alogliptin/pioglitazone)可用於以下狀況之成年第二型糖尿病治療：(1) 使用alogliptin 單方每日25 mg 或pioglitazone 單方每日30 mg 治療仍控制血糖不佳者。(2) 與metformin 併用，本品適用於已使用alogliptin每日25 mg 加上metformin(使用劑量≥每日1500 mg或已達最高耐受劑量)治療仍控制血糖不佳者、或已使用pioglitazone 每日15或30mg 加上metformin(使用劑量≥全每日1500 mg 或已達最高耐受劑量) 治療仍控制血糖不佳者。(3) 已使用alogliptin 以及pioglitazone 控制良好的患者，可與本藥品互換使用。
91次	"Amgen" Repatha Solution for Injection	Evolocumab Inj. 140mg	Amgen	同合子家族性高膽固醇血症：Repatha適用於飲食及其他降血脂療法(如：statins、ezetimibe、LDL血漿析離術)之輔助療法，用以進一步降低LDL-C，但LDLR-negative mutation之病人除外。
91次	Lipanthyl Supra Film-Coated Tablet 160mg	Fenofibrate F. C. Tab 160mg	Abbott	高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症、混合型高血脂症(TYPE II a、II b、III、IV、V)。
91次	Latuda 40mg Tablet	Lurasidone HCL Tab 40mg	大日本住友	1.1 思覺失調症 LATUDA用於治療成人和青少年(13至17歲)的思覺失調症。 1.2 第一型雙極性疾患之鬱症發作 單一療法: LATUDA 的單一療法是用於治療患有第一型雙極性疾患之鬱症發作的成人病患。LATUDA的有效性是建立在治療具有雙極性疾患的鬱症發作之成人病患，為期六週之單一療法試驗。 配合鋰鹽或Valproate之輔助療法: LATUDA配合鋰鹽或valproate的輔助療法是用於治療患有第一型雙極性疾患之鬱症發作的成人病患。LATUDA輔助療法的有效性是建立在治療具有雙極性疾患的鬱症發作之成人病患，為期六週配合使用鋰鹽或valproate之輔助療法試驗。 LATUDA長期使用(超過六週)的有效性尚未以控制組試驗建立。因此，醫師選擇LATUDA長期治療時，應定期評估個別病患於長期使用此藥物之可用性。 LATUDA用於治療雙極性疾患之躁症發作的有效性，目前尚未建立。

第91次藥事會(107.03.23)品項異動公告

第91次藥事會刪除品項公告

會次	商品名	成份規格含量	廠牌	適應症
91次	Capecitabine Alvogen Tab. 500mg	Capecitabine Tab. 500mg	美時	可治療轉移性大腸(結腸直腸)癌病患。可作為第三期結腸癌患者手術後的輔助性療法。Capecitabine與Docetaxel併用於治療對Anthraclyline化學治療無效之局部晚期或轉移性乳癌病患。亦可單獨用於對紫杉醇(Taxane)及Anthraclyline化學治療無效,或無法使用Anthraclyline治療之局部晚期或轉移性乳癌病患。Capecitabine合併Platinum可使用於晚期胃癌之第一線治療。
91次	Rich Cap 30mg-N.K	Lansoprazole Cap. 30mg	南光	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃食道逆流性疾病-糜爛性逆流性食道炎之治療、胃食道逆流性疾病之症狀治療、Zollomger-Ellison症候群、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)相關的消化性潰瘍、治療因NSAID類藥物引起之胃潰瘍。
91次	Pexo Tab 0.25mg	Pramipexole Tab 0.25mg	五洲	治療自發性巴金森氏症的徵候及症狀。治療原發性腿部躁動症(Primary Restless Legs Syndrome)的症狀。
91次	Medazole Injection 500mg	Metronidazole Inj. 500mg	榮民製藥	厭氧性菌引起之感染症
91次	Tamlosin SR Cap 0.2mg	Tamsulosin HCl 0.2mg	生達	前列腺肥大症(增生)所伴隨的排尿障礙。
91次	Carisoma 250mg Tab	Carisoprodol Tab 250mg	健亞	焦慮緊張症,經常緊張,肌炎,椎間神經痛,坐骨神經痛,頸痛,風濕性關節炎,骨關節炎,肌肉僵硬,肌肉痛。
91次	Viekirax F.C. Tab. 12.5/75/ 50mg 俟Maviret取得健保給付後刪除本品項	Ombitasvir 12.5mg, Paritaprevir 75mg, Ritonavir 50mg	瑞士商 艾伯維	Viekirax適用於與Exviera、ribavirin併用(併用方式詳參劑量與投藥方法段),以治療成人慢性C型肝炎基因型1、4之感染。
91次	Priligy Tab 30mg	Dapoxetine HCL Tab. 30mg	美納里尼	Priligy用於治療年齡18-64歲且符合下列所有條件的早發性射精男性: 1.陰道內射精潛伏時間短於2分鐘。2.難以控制射精,在性行為插入之前、當時或不久後經過輕微刺激,發生持續或復發性射精。3.因為早發性射精而導致病人明顯沮喪。
91次	Nobelin XR Tab 750mg	Levetiracetam XR Tab 750mg	南光	治療16歲以上病患之局部癲癇發作之輔助治療。
91次	Kogenate FS 1,000IU, 500IU, 250IU/vial Kovaltry Inj. 1,000IU,500IU/vial上線漸進取代本品項(半年內)	Factor VIII 1,000IU, 500IU, 250IU/vial	臺灣拜耳	1.治療A型血友病。2.無關節損傷之A型血友病患童的常規預防。3.常規預防性治療,用以防止或減少在A型血友病成人中的出血事件發生頻率。
91次	Lipanthyl Cap 200mg	Fenofibrate micronised 200mg Cap	Abbott	高脂質血症

第91次藥事會(107.03.23)品項異動公告

會次	商品名	成份規格含量	廠牌	適應症
91次	Ozapex Orodispersible Tablets 5mg	Olanzapine OD Tab 5mg	品庠醫藥生技	思覺失調症及其他明顯有正性及／或負性之精神病，雙極性疾患之躁期發作，預防雙極性疾患之復發。
91次	Zometa Inj 4mg	Zoledronic acid Inj. 4mg	諾華	治腫瘤之高血鈣併發症。乳癌前列腺癌多發性骨髓瘤預防骨受傷事件。
91次	Telebrix 30 Meglumine	Meglumine Ioxitalamate 66.03gm/100ml	Guerbet	末梢動脈、選擇性動脈、靜脈造影劑。
91次	Gastro-Timelets SR Cap 30mg	Metoclopramide SR Cap 30mg	東生華	促進胃腸蠕動、止吐。
91次	"百特" PD-2含1.5%, 2.5%, 4.25%葡萄糖腹膜透析液 1.5L (3項) "百特"含1.5%, 2.5%, 4.25%葡萄糖低鈣腹膜透析液 1.5L (3項)	略	Baxter	腹膜透析
91次	Clatine syrup	60mg/60ml Loratadine syrup	生達	抗過敏劑、治療流鼻水、止癢。
91次	Bleocin inj 5mg	5mg Bleomycin	Nippon-Kayaku	皮膚癌及頭頸部癌（上顎癌、舌癌、口唇癌、咽頭癌、口腔癌）、肺癌（原發性及轉移性扁平上皮癌）、食道癌、惡性淋巴腫。
91次	Fluorouracil Germany inj 1gm	1gm Fluorouracil	Haupt Pharma/美納	大腸癌、乳癌、結腸癌。

第91次藥事會(107.03.23)品項異動公告

第91次藥事會恢復續用品項公告

會次	商品名	成份規格含量	廠牌	適應症
91次	Tramacet F.C. Tablets	Acetaminophen 325mg (Eq To Paracetamol), Tramadol HCl 37.5mg	五洲	使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重疼痛
91次	Levofloxacin F. C. Tab. 750mg "P.L."	Levofloxacin Hemihydrate Tab 750mg	培力	治療成人因對Levofloxacin有感受性的致病菌所引起之下列感染：急性鼻竇炎、慢性支氣管炎的急性惡化、社區性肺炎、複雜性泌尿道感染(包括腎盂腎炎)、慢性細菌性前列腺炎、皮膚和軟組織感染。
91次	Signifor Inj. 0.9mg	Pasireotide Diaspartate Inj. 0.9mg	諾華	適用於治療無法接受腦下垂體手術或已接受此手術未能治療的庫欣氏病 (Cushing's disease)患者。
91次	Sovaldi Tab. 400mg	Sofosbuvir Tab 400mg	吉立亞	成人患者：SOVALDI與其他藥物併用可以治療患有慢性C型肝炎病毒(HCV)感染症的成人患者。•與pegylated interferon及ribavirin併用可治療未併有肝硬化或併有代償性肝硬化的基因型1或4感染症。•與ribavirin併用可治療未併有肝硬化或併有代償性肝硬化的基因型2或3感染症。兒童患者：SOVALDI與ribavirin併用可治療12歲(含)以上或體重至少35公斤以上，且未併有肝硬化或併有代償性肝硬化之兒童患者的慢性HCV基因型2或3感染症。
91次	Harvoni Tab. 90mg/400mg	Ledipasvir 90mg, Sofosbuvir 400mg	吉立亞	HARVONI適用於治療慢性C型肝炎病毒(HCV)基因型1、2、4、5或6感染症成人患者。HARVONI適用於治療12歲(含)以上，且未併有肝硬化或併有代償性肝硬化的基因型1慢性C型肝炎感染症之兒童患者。
91次	Natacyn Oph. Suspension 5% 15ml	Natamycin Oph. Susp. 5% 15ml	Alcon/諾華	治療因黴菌引起之驗角炎、結膜炎及角膜炎。