

# 刺激性(Irritant)及起皰性(Vesicant)化療藥物外滲處理建議

臺中榮總藥學部化療藥局  
2024/03/19 更新

分類	藥名	外滲處理
起皰性－蔥環類	Doxorubicin	冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1-2 天。抬高四肢，避免酒精敷料，必要時給予止痛劑。
	Epirubicin	
	Idarubicin	
起皰性－抗生素類	Mitomycin-C	冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1-2 天。抬高四肢，避免酒精敷料，必要時給予止痛劑。
	Dactinomycin	冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1-2 天。避免酒精敷料，必要時給予止痛劑。
起皰性－紫杉醇類	Paclitaxel	溫敷 15~20 分鐘，每天至少 4 次，持續 1~2 天。抬高四肢，必要時給予止痛劑。
	Docetaxel	
	Cabazitaxel	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
	nab-paclitaxel	
起皰性－植物鹼類	Vinblastine	溫敷 20 分鐘，每 6 小時一次，持續 1-2 天。抬高四肢，必要時給予止痛劑。
	Vincristine	
	Vinorelbine	
起皰性－未分類	Trabectedin	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
	Eribulin	
刺激性/起皰性－鉑金類似物	Cisplatin (藥物濃度 > 0.5mg/ml 且外滲容量 > 20ml，可能產生組織壞死)	冷敷，每 8 小時 1 次，每次 60 分鐘，持續 3 天。
刺激性/起皰性－烷基化合物類	Bendamustine	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
刺激性/起皰性－抗代謝類	Mitoxantrone	冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1-2 天。抬高四肢，避免酒精敷料，必要時給予止痛劑。
刺激性－蔥環類	Liposomal Doxorubicin	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。

# 刺激性(Irritant)及起皰性(Vesicant)化療藥物外滲處理建議

臺中榮總藥學部化療藥局  
2024/03/19 更新

分類	藥名	外滲處理
刺激性－抗代謝類	Fluorouracil	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。必要時給予止痛劑。
	Gemcitabine	
	Pralatrexate	
	Cytarabine	
	Fludarabine	
	Methotrexate	
	Pemetrexed	
	Clofarabine	
刺激性－抗生素類	Etoposide	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
	Bleomycin	
刺激性－拓撲異構酶抑制劑	Irinotecan	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
	Irinotecan, liposomal	
	Topotecan	
刺激性－烷基化合物類	Ifosfamide	冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1-2 天。抬高四肢，必要時給予止痛劑。
	Carmustine	冷敷 20 分鐘，每 6 小時一次，持續 1-2 天。抬高四肢，避免酒精敷料，必要時給予止痛劑。
	Cyclophosphamide	冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。抬高四肢，必要時給予止痛劑。
	Dacarbazine	冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1-2 天。避免酒精敷料，必要時給予止痛劑。
	Melphalan	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
刺激性－鉑金類似物	Carboplatin	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
	Oxaliplatin	
刺激性－未分類	Brentuximab	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
	Carfilzomib	
	Ixabepilone	