

護理站消耗性藥品之保存期限

品 名	貯存條件及開封後保存期限
Alcohol 75% (500 ml)	開封後保持乾燥，遠離火源、日照、潮濕，因所含成分易揮發開封後減少開瓶次數及時間； 使用期限 6 個月^b 。
Alcohol 75% gel (500 ml)	開封後保持乾燥，遠離火源、日照、潮濕，因所含成分易揮發開封後減少開瓶次數；使用期限 6 個月 ^b 。
Alcohol 95% (500 & 4000 ml)	因所含成分易揮發保持乾燥，遠離火源、日照、潮濕，開封後減少開瓶次數及時間，可用至原瓶有效效期 ^a 。
H ₂ O ₂ (雙氧水)	開封後在室溫(25°C 以下)、避光、乾燥環境中貯存，開封後減少開瓶次數及時間； 使用期限 6 個月^a 。
Antigerm (Hi-bi scrub 5000 ml)	在室溫(25°C 以下)、避光、乾燥環境中貯存。 原桶開封未污染到原溶液，且使用後立即旋緊瓶蓋，可用至有效期限；分裝瓶建議使用期限 6 個月^a 。
Chlorhexidine 2% + Ethanol 75% (200mL Easy antiseptic liquid 2%)	含酒精，遠離火源、日照、潮濕，開封後避免污染、減少開瓶次數及時間；使用期限 1 個月 ^a 。
Chlorhexidine 2% (200ml Aqua easy antiseptic 2%)	開封後在室溫、避光、乾燥環境中貯存，開封後避免污染、減少開瓶次數及時間；使用期限 1 個月 ^a 。
Polvidine in Alcohol 70% (Andine alcoholic soln 10% 500 ml)	含酒精，遠離火源、日照、潮濕，開封後避免污染、減少開瓶次數及時間；使用期限 1 個月 ^a 。
Polvidine Solution (100 & 250 ml)	開封後在室溫(25°C 以下)、避光、乾燥環境中貯存，開封後避免污染；使用期限 1 個月 ^a 。
Normal Saline 沖洗用	開封後保持陰涼乾燥，一天內丟棄 ^a 。
Lidocaine Jelly	開封後在室溫、避光、乾燥環境中貯存，開封後避免污染； 使用期限 3 個月^b 。
Xylocaine® Spray 10%	開封後在室溫、避光、乾燥環境中貯存，開封後避免污染； 使用期限 3 個月^a 。
Silvazine 200 gm / Bot	開封後在室溫、避光、乾燥環境中貯存，開封後避免污染； 使用期限 1 個月^b 。

名詞解釋：

1. 使用期限(Beyond-Use Date)：藥品在「開封後於原容器中保存條件良好」的情況下，可使用的最後期限。
2. 有效期限(Expiration Date)：藥品在「未開封且保存條件良好」的情況下，可使用的最後期限。

參考資料：

- a. 廠商資料、b. NHS Good Practice Guidance for Care Homes: Expiry dates for medication 2022。